令和4年度

購買ガイドブック



ご予約は令和3年10月15日までにお願いします。

いつまでも地域と共に歩みたい
JA長生
ながいき なかま

2021年9月
長生農業協同組合

令和4年度肥料・農薬予約注文、購買ガイドブックについて

組合員の皆様におかれましては、日頃、JA各事業につき、格別なるご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

標題の件につきまして取りまとめの時期となりました。お忙しい中、誠に恐縮に存じますが、JAでは皆様に安価安定供給のため予約購買制度に基づいた予約注文に取り組んでおりますので、ガイドブックをご参照し、折込の注文書にて申し込みいただきますようお願いいたします。

注文書の回収につきましては、10月15日㈮までにJA担当職員がお伺いします。

令和4年度ガイドブックにつきましても、JA長生で取り扱っております生産資材、生活資材及び食品関係の一部を掲載いたしましたので、ご利用ください。

昨年より、肥料大口予約奨励につきまして、支出基準を大きく見直しております。

また、集約銘柄肥料の導入、農薬の大型規格による生産コストの削減に向けた取り組みを実施しておりますので是非、ご利用くださいますようお願いいたします。

医薬用外毒物・劇物農薬の取り扱いについて

医薬用外毒物・劇物農薬の取り扱いは、毒物及び劇物取締法の定めにより、販売所としての登録要件を満たした営農購買センター(南部・北部・西部)のみの取り扱いとなり、支所経済窓口での取り扱いが出来なく、ご不便をおかけしております。

支所窓口での取り扱いは、営農購買センターより組合員宅への配達にてお届けしておりますので、改めてご案内いたします。ご利用の際は、予約注文にてお願いいたします。なお、配達時不在の場合は、持ち帰る場合がございますので、ご了承くださいます様お願いいたします。詳しくは、営農購買センターにお尋ねください。

目　　次

令和4年度　肥料・農薬大口予約奨励金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

JA長生　コスト低減の取り組み　肥料・農薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
（裏面 2022年ちばのコシヒカリ・ふさおとめ・ふさこがね・粒すけ栽培ごよみ）

エコホープDJの使用方法と注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

種子消毒～育苗のポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

用土消毒の方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

ジャンボタニシ食害防止の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

カメムシ（斑点米）防除の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

土の健康診断してみませんか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
（土壌診断に基づく適正施肥）

集約肥料・農薬メガ得規格の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

肥料の紹介・・ 13

農薬の紹介・・ 25

資材の紹介・・ 36

生活資材・食品の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

次世代の農業に向けた取り組み～ドローンの活用～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

令和4年度　春肥料予約注文書（黄色注文書）

令和4年度　水稲農薬予約注文書（青色注文書）

令和4年度　水稲低コスト大型規格農薬予約注文書（ピンク注文書）

各注文書はガイドブック内に入れ込んであります。

○肥料注文書　24ページ、25ページの間

○農薬注文書　36ページ、37ページの間

○水稲低コスト大型規格農薬注文書　巻末

注文書（提出用）のみ、切り離してください。

春肥料 農薬

大口予約奨励金について



肥料の奨励金について

1　供給対象期間: 2022年3月までの予約注文で、4月末日までの配送・引取分まで。

2　対象外品目:　●堆肥（菜種油粕・脱脂ぬか・魚粕・牧場のめぐみ）
●系統外肥料
●水稲軽量一発特号

●肥料の支出基準

予約購入金額が、40万円以上で	➡	購入金額の	3%	助成
予約購入金額が、100万円以上で	➡	購入金額の	5%	助成
予約購入金額が、150万円以上で	➡	購入金額の	7%	助成
予約購入金額が、250万円以上で	➡	購入金額の	8%	助成
予約購入金額が、350万円以上で	➡	購入金額の	9%	助成

※支出時期は、2022年 10月に購買品取引口座に振込予定です。

水稲農薬の奨励金について

1　供給対象期間: 2022年3月までの予約注文で、4月末日までの配送・引取分まで。

2　対象品目:　水稲農薬予約注文書にて記載されている大口奨励品目
◇注文書の大口奨励欄に○印がついている商品です。
▷メガ得規格（担い手直送）は、大口奨励対象外です。

●水稲農薬の支出基準

予約購入金額 20万円以上 ➡ 購入金額の 10% 助成

JA長生 コスト低減の取り組み ①肥料

担い手直送(春肥料)の取り組みについて

朗報!! 肥料でも直送ができるようになりました!!

輸送費や肥料原料の高騰を受け、資材の価格も年々値上がりしておりますが、メーカーの協力を得てコストパフォーマンスの高い価格でのご提供が可能となりました!

担い手直送(肥料)のメリット

●**まとめて発注することで、ご自宅・倉庫へ配送いたします! 配送料は、かかりません!**
注文の段階で、通常予約価格よりも値下げをし、組合員のご自宅・倉庫へメーカーから直送するため、配送料も掛かりません。

●**大口奨励金対象商品です!**
昨年度、JA長生の春肥料奨励対象金額が改定されました。
大口奨励金の対象となります。

担い手直送【肥料】の対象となる条件

❶12トン以上の発注数量。
- 15kg袋だと800袋以上、20kg袋だと600袋以上の発注が必要です。15kg袋・20kg袋の積み合わせもOK!! 合計重量が12トンになれば、直送出来ます!!

❷原則12トン車が出入りでき、フォークリフト・パレットをお持ちの方。
- 納品は一か所で、12トン大型トラックの出入りができる場所に限ります。また、フォークリフトをお借りしての納品となります。荷下ろし時は立会いをお願いします。

❸キャンセル・返品は、お受けできません。
- 事前予約直送の為、トラック手配等決まってしまうので、キャンセル・返品はお受けできません。ご承知くださいますようお願いいたします。

担い手直送【肥料】対象商品



コシヒカリ一発15　15kg



ふさこがね一発15　15kg



飼料用米専用一発15　15kg

他にも取扱商品がありますので、営農購買センターへお問い合わせください!

JA長生 コスト低減の取り組み ②農薬

担い手直送(メガ得規格 4ha分)の取り組みについて

昨年よりご案内しております水稲農薬の『メガ得規格(4 ha分)』ですが、様々なご要望にお応えして豊富なラインナップをご用意いたしました。購買ガイドブックの巻末に注文書がございますので、是非ともご覧ください。また、『メガ得規格(4ha分)』以外にも、『デカ得規格(10kg粒剤・2Lフロアブル)』がございますので、併せてご覧ください 。

担い手直送(水稲農薬)のメリット

●**メーカー直送または購買センターから配達いたします!**
ご注文時に配送予定日をお選び頂ければ、その時期に配送いたします。
【土日・祝日、GWの期間は配達を行っておりません。また、時間指定等も出来ませんのでご了承ください。】
※注文締切日※
■第1回注文受付日 令和3年10月15日~令和4年1月14日まで。配送日 令和4年3月中旬より随時配送予定。
■第2回注文受付日 令和4年 1月21日~令和4年3月 3日まで。配送日 令和4年4月中旬より随時配送予定。

●**メガ 得規格(4ha分)はkg換算でコストメリット抜群!**
『メガ得規格(4ｈａ分)』は大口奨励金の対象外ですが、kg換算するとぐ~んとお得感を感じることができますよ!



メガ得規格(4ha分)をご注文の方にお願い!
メーカー完全受注生産の為、返品は出来ませんのでご了承ください!

担い手直送【農薬】取り扱い商品



他にも取扱商品がありますので、営農購買センターへお問い合わせください!

2022年 JAグループ千葉は「安全・安心」な米づくりを目指します

ちばのコシヒカリ ふさおとめ ふさこがね 粒すけ

栽培ごよみ

JAグループ千葉


土づくり

☆美味しく、良質なお米は土づくりから！　土壌診断を行い、不足している成分は積極的に施用しましょう。

近年の高温対策に、「けい酸」の補給を！　稲はケイ酸を非常に好む作物です。けい酸を施用することで、高温期の蒸散を促し、クーラー効果を得ることが出来ます。　お勧め資材 刈取後には「農力アップ」、基肥・中干し前には「けい酸加里」

稲わら腐熟促進　地力維持のため有機物(稲わら・堆肥)等を施用し、深さ15cmを目標に耕うんしましょう	石灰窒素 わらゴールド	10～15kg 30kg	リン酸補給で丈夫な根づくりをしましょう	ようりん 苦土重焼りん	40～60kg 20～40kg　砂質土に適する 粘質土に適する
けい酸の補給で丈夫な体をつくりましょう	ケイカル 農力アップ	100～200kg　秋～冬期に施用する 60～100kg　秋～冬期に施用する	加里を補給して体づくりと光合成のサポートをしましょう	けい酸加里 塩化カリ	20～40kg　荒代時または中干し前 10～20kg　荒代時

生育ステージ



肥培管理

基肥

- 過繁茂・倒伏を避けるため、品種ごとの施肥基準に従い、施肥しましょう。
- 側条施肥の場合は、窒素の利用率を考慮し1割～3割減肥しましょう。
- 全量基肥一発肥料は基本的に、穂肥分は窒素のみなので、加里分が不足しない様、土壌診断を定期的に実施し、補いましょう。

穂肥

- 穂肥の適期は出穂の18日～10日(幼穂長1cm～8cm)、10aあたり窒素量で3kgを施用しましょう。
- 穂肥施肥が早いと倒伏や籾数過剰、遅いと食味の低下につながるので注意しましょう。
- 茎数が多い圃場や葉色の濃い圃場では施用量を減らしましょう。

けい酸補給

- 土づくり時にけい酸を補給できなかった圃場は根の活力を維持するために、「けい酸加里」を40kg/10ａを施用しましょう。

※基肥時施肥で茎数アップ、中干し前施肥で倒伏軽減

施肥基準(成分量kg/10a)　※施肥量、使用量は10a当たり。

コシヒカリ

土壌	窒素 基肥	窒素 穂肥	りん酸 基肥	加里 基肥	加里 穂肥
砂質	3～4	3～4	7～9	8	3
壌質	2～3	3			
粘質 黒ボク	2	2			
粘質 その他	2～3	3			

ふさおとめ

土壌	窒素 基肥	窒素 穂肥	りん酸 基肥	加里 基肥	加里 穂肥
砂質	4～5	3	7～9	8	3
壌質	3～4	3			
粘質 黒ボク	1～2	1～2			
粘質 その他	3	3			

ふさこがね

土壌	窒素 基肥	窒素 穂肥	りん酸 基肥	加里 基肥	加里 穂肥
砂質	5～6	3～4	7～9	8	3
壌質	4～5	3			
粘質 黒ボク	3～4	2～3			
粘質 その他	4	3			

粒すけ

土壌	窒素 基肥	窒素 穂肥	りん酸 基肥	加里 基肥	加里 穂肥
砂質	6～8	3	7～9	8	3
壌質	3～5	3			
粘質 (黒ボク)	2～3	2			

難防除雑草対策(例)

	代かき −7日	田植え	14日	30日	収穫60日前	収穫50日前	収穫45日前
コナギ・オモダカ	サキドリEW（代かきから移植まで7日以上ある場合）			プライオリティフロアブル ディオーレフロアブル ボデーガードプロフロアブル(ノビエ3)	レブラスジャンボ	アトトリ豆つぶ250	
		サキドリEW（代かきから移植まで7日未満の場合）					
ホタルイ		サキドリEW		カイリキZフロアブル プライオリティ豆つぶ バッチリLXフロアブル(ノビエ2.5)	レブラスジャンボ クリンチャーバス液剤		
オモダカ		サキドリEW		ボデーガードプロフロアブル(ノビエ3.5)	クリンチャーバス液剤	ツイゲキ豆つぶ250	刈取り後 ラウンドアップマックスロード
		カチボシ1キロ粒剤51(ノビエ2.5) プライオリティ豆つぶ		アトトリ豆つぶ250			

耕起前のラウンドアップマックスロード処理も有効(耕起前に発生している場合)。

近年、多発生の問題雑草。早くから、だらだらと発生するため、多発圃場では一発剤のみに頼らず、体系処理を実施する。

- 代かき後30日前後が発生盛期。初期剤と初中期一発剤または中期剤、もしくは初中期一発剤と中期剤の体系防除を行います。
- 秋に塊茎(イモ)をつくり、翌年更に多く発生するため、稲刈取り後に根まで枯らすラウンドアップ等が有効。

病害虫防除

初期害虫





育苗箱施用

- 殺虫剤：アドマイヤー CR箱粒剤(50g/箱・播種時(覆土前)～移植当日・1回)
- 殺虫・殺菌(いもち病)混合剤：※空散除外・未実施地域推奨　エバーゴルフォルテ箱粒剤　(50g/箱・は種時(覆土前)～移植当日・1回)※いもち病・紋枯病に登録あり。

- 多発生時、被害がとまらない場合は追加の本田防除をおこないましょう。
- 本田防除薬剤　トレボン、スタークル、MR.ジョーカー剤等

※成虫には粒剤、幼虫には粉剤で対策を取りましょう。

病害







- オリブライト1キロ粒剤　(1kg・出穂10日前・収穫45日前・1回)　(いもち病・紋枯病登録)、250g(豆つぶ)もあり。
- モンガリット粒剤　(3～4kg・収穫45日前・2回)　(稲こうじ・紋枯病登録)
- フジワンモンカット粒剤　(3～4kg・出穂30～10日前・収穫30日前・2回)(いもち病・紋枯病登録)
- ブラシン粉剤DL　(3～4kg・収穫7日前・2回以内)(いもち病・ごま葉枯病・稲こうじ病)

- 紋枯病・稲こうじ病は病害が多発してからでは防除が困難なので、常発田では発病前から薬剤を散布しましょう。

斑点米カメムシ類







農薬名		処理量(10a)	収穫前日数	使用回数	散布の適期
スタークル	粒剤	3kg	収穫7日前	3回	出穂期から穂揃期に散布
	豆つぶ	250g			
	液剤10	8倍　0.8L(空中散布)			
		1000倍　60～150L(散布)			
キラップ粒剤		3kg	収穫14日前	2回	出穂10日前から出穂期に散布

- 斑点米カメムシ類は、出穂時期になると水田周辺の雑草地から侵入してくる。出穂2週間前までには水田周辺の草刈りや除草剤の散布を行い、侵入を抑制しましょう。

※出穂期は、圃場全体で穂が4～5割出穂した時、穂揃期は、圃場全体で穂が8～9割出穂した時が目安となります。

中干しと水管理

乳白米防止とカドミウム吸収抑制のために水管理の徹底を！

1．過繁茂を抑制し、根の活力を維持するため、目標茎数の80%（コシヒカリの場合）になったら中干し開始。過繁茂時に日照不足になると乳白粒、腹白粒の発生が多くなります。
2．自然由来のカドミウムの吸収を抑えるため、幼穂を確認したら入水し、出穂3週間前～出穂2週間後(計5週間)までは湛水状態を保ちましょう。
　出穂後2週間は高温・水不足により基白粒、背白粒が発生しやすい時期。
3．登熟を良好にするため、早期落水は避け、収穫直前の出穂後25日頃まで間断かんがいを続けましょう。



＊薬剤の使用に当たってはラベルをよく読み、使用基準を厳守しましょう。　＊使用した農薬・肥料・作業内容はしっかりと生産履歴簿に記帳しましょう。　●農薬散布時の飛散に注意しましょう。　●除草剤使用時には7日間落水、かけ流しはやめましょう。

苗半作！良質な苗で良質な米づくり

適正な浸種・催芽の管理で病気の発生を予防しましょう。

浸種水温	10～15℃
浸種期間	10℃の場合10日、15℃の場合7日を目安
催芽温度	30℃
播種後～出芽揃い	30℃以下
緑化期	昼間20～25℃、夜間10～20℃
硬化期	5～25℃

種子伝染性病害の「ばか苗病」・「いもち病」・「細菌性苗立枯(もみ枯細菌病、褐条病)」の発生を予防するために、種籾の消毒と用土消毒を必ず行い、育苗中は温度管理・水管理に注意しましょう。また、緑化期以降は徒長苗防止のためハウスの換気に努めましょう(ハウス内の温度目安は10℃～25℃)。

種子消毒



ヘルシードT フロアブル



テクリードC フロアブル

用土消毒



フタバロンA 粉剤

立枯病対策剤



ナエファイン フロアブル



タチガレエース M液剤

栽植密度(55株～60株/坪)を守って、良質米生産

目標収量と収量構成要素の目標(60株植/坪 壌質土の圃場)

	目標収量		穂数		一穂籾数		登熟歩合		千粒重
コシヒカリ	540kg/10a	=	400本/㎡(22本/株)	×	80粒	×	80%	×	21.0g
ふさおとめ	570kg/10a	=	470本/㎡(26本/株)	×	65粒	×	85%	×	22.5g
ふさこがね	600kg/10a	=	380本/㎡(21本/株)	×	80粒	×	85%	×	23.5g
粒すけ	630kg/10a	=	400本/㎡(23本/株)	×	77.5粒	×	85～90%	×	23.0g

スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)防除

特徴




- 移植3週間くらいまでの柔らかい苗を食害する。
- 水があるところを好み、水田のくぼみや周辺の水路にも多く生息している。
- 低温に比較的弱く、1cm未満の貝が越冬する確率は低い。一方で乾燥には比較的強く、水のない状態でもでも半年程度は生き残る。

対策

- 取水口に5mm目合いのネットや金網を設置し、本田への侵入を防ぐ。
- ピンクの卵塊を見つけたら、除去または水中へ沈める。
- 中干し時、水が溜まるところに集まるので、一斉に捕殺する。薬剤防除を行う場合は、スクミノン(1～4kg/10a・収穫60日前・2回)を散布する。
- 防除に有効な石灰窒素を施用する(刈取り後、もしくは翌年植付前で水温が15℃以上のときに湛水して3～4日後に20～30kg/10ａ散布する。魚毒性があるので8日は湛水を保ち、落水、かけ流しは避けます。また、次作の施肥量にも注意しましょう。)
- 稲わらのすき込み時には、ロータリー回転速度上げ、トラクターの速度を遅くして丁寧に耕うんして、潜っている貝を砕くようにする。

ジャンボたにしくん



スクミンベイト



スクミノン



バダン粒剤



収穫時は異物・異品種の混入防止対策を徹底しましょう

①収穫前に畦畔の雑草(特にクサネムなど)を処置しましょう。
②圃場内の空き缶・空きびん等のゴミを回収しておきましょう
③農機具の点検・清掃を丁寧に行いましょう。
④収穫調製米用袋を使って異品種の混入を防ぎましょう。
⑤作業場の衛生管理に努めましょう。



エコホープDJの使用方法と注意点

※エコホープDJは千葉エコ対象の商品です

(1)エコホープDJとは⇒減農薬栽培(千葉エコ)において成分カウントされません。
微生物農薬の種子消毒剤です。
化学農薬と性質が異なるため、剤の特性をよく理解することが必要です。

(2)エコホープDJ使用時のポイント


①【重要!】水管理、温度管理を適正に行ってください。

②種子消毒後の風乾作業は必要ありません。
(過度の風乾は効果減少のおそれあり)

③種もみ浸種水温は10℃以上とし、催芽もハト胸状態まで行うと効果的。
低水温での浸種は催芽不十分となりやすく、出芽不良がおきやすくなります。

④催芽、出芽は30℃が成功の秘訣。催芽・出芽を十分行ない苗を揃える。
特に無加温出芽の場合は保温につとめて下さい。

エコホープDJの上手な使い方



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリコデルマ アトロビリデを含む農薬の総使用回数
稲	ばか苗病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病	200倍	浸種前～催芽前	—	24～48時間種子浸漬	—
		200倍	催芽時		24時間種子浸漬	
	いもち病、苗立枯病(リゾープス菌)	200倍	浸種前～催芽時			

※規　　格:100g(一年で使い切って下さい。)
※保存方法:常温保存(4～27℃)

エコホープDJは生き物です! 効果を十分に発揮させるには…
適正な温度管理・かん水管理が必要です!
教科書どおりの温度管理・育苗管理の実施をお願いします

種子消毒～育苗のポイント

病害発生予防のために、播種後の温度管理・水管理には十分注意する。

緑化期以降は徒長苗防止のためハウスの換気に努める。

1.<種子消毒>の方法について

※種子は消毒してありませんので、各自で必ず種籾消毒を行ないましょう。

(1)目的:種子伝染性(バカ苗病・細菌病・いもち病)病害の、発生を防ぐために行ないます。



バカ苗病



もみ枯細菌病



褐条病

(2)種子消毒剤使用上の注意点

①防除効果の高い薬剤の選定。
(スターナ含有剤は「もみ枯細菌病」「褐条病」に対する薬剤体性が確認されたので使用を控える。)
②消毒するときの水温は、約10℃が目安。
③消毒時の種籾と薬液の容量比は1:1以上。
④浸漬時間と希釈濃度は必ず守る。
⑤24時間浸漬後の陰干しと、その後の浸種3日間が重要。
⑥種子消毒に使用した薬液は適切に処分する。


(3)種子消毒剤及び使用方法

①使用薬剤名
「ヘルシードTフロアブル」「テクリードCフロアブル」**200倍24時間**浸漬
浸漬する時、よく揺するのがポイントです。また消毒後は風乾し水洗いせずに、浸種します。
②使用方法(下表参照)
水20リットルに対して、**ヘルシードTフロアブル**1本(100ml)または**テクリードCフロアブル**1本(100ml)を入れると、使用濃度の「200倍」です。

薬剤の使用量と種籾量の目安

希釈濃度	種籾量	4kg (1袋)	10～12kg (2.5～3袋)	20kg (5袋)	40kg (10袋)
200倍	薬　量	40ml	100ml(1本)	200ml(2本)	400ml(4本)
	水　量	8リットル	20リットル	40リットル	80リットル

種籾20kgの場合の使用方法（下図参照）



購入種子別種子消毒の手順

一般種籾の場合	低温貯蔵種籾の場合
種籾消毒（24時間浸漬）	**種籾消毒（24時間浸漬）**
陰干し（1日間）	**陰干し（1日間）**
※浸　種（3日間）	**※浸　種（3日間）**
水交換	水交換
浸　種（3日間）	浸　種（3日間）
水交換	水交換
浸　種（2日間）	浸　種（3日間）
水交換	水交換
浸　種（2日間）	浸　種（2日間）
催　芽・播　種	水交換
	浸　種（2日間）
	催　芽・播　種

※テクリードCフロアブルを使用の場合は陰干ししなくても可。

※浸種始めの3日目までは「種子消毒中」なので、水を交換したり動かしたりしない。

※浸種4日目からは、毎日水交換を行っても良い。
（浸種水温の上昇を防ぐため）

※浸種は、発芽を揃えるため、積算水温で100℃程度を目安に、水温15℃の場合は約7日間（水温10℃の場合は10日間）浸種し、十分に吸水させます。早期の低温時は避けてください。

※催芽は、30℃を目安（30℃以上は細菌病の発生を助長するため）にし、出芽を揃えるため、幼芽長が1㎜以内の「ハト胸状態」で催芽を終えるようにします。

＜用土消毒＞の方法について

（１）目的：育苗箱に発生する苗立枯病（カビ）や、細菌病の発生を予防するために行います。

（２）用土消毒剤使用上の注意点

①薬剤と育苗培土との混和は、播種7日前～播種直前に行なう。
②薬剤の使用量をきちんと守る。　③混和は均一に行なう。
④播種前の床土への潅水はたっぷりと行なう。　⑤播種直後の覆土への潅水はしない。

（３）使用薬剤及び使用方法

・苗立枯病（リゾープス菌）、細菌病予防に、20リットル（培土約1袋）に対して「フタバロンA粉剤」を100ｇ混和し、覆土に使用する。
・床土への潅水と、播種後の覆土が少ないと「根上がり」をしやすくなるので、注意する。


※細菌性病害は、発生すると治す薬剤がありません。「フタバロンA粒剤」はカスガマイシン剤を含有、「もみ枯細菌病」にも優れた効果を発揮します。また、薬剤防除のほか、育苗期は高温にならないように温度管理にも注意しましょう。

床土・覆土の消毒（使用にあたっては必ずマスク着用）

培土の消毒

苗立枯病（リゾープス菌）、細菌病予防に

（育苗箱1箱5L（20Lで4箱））



●覆土（1L）に
フタバロンA粉剤5g/箱を混和する。
（※20Lの培土にフタバロンA粉剤
100g）を混和し、覆土に使用する。）





苗立枯病（リゾープス、フザリウム、ピシウム）の
予防に、ナエファインフロアブル1,000倍液を箱あたり
500ml 播種時～緑化期（2回以内）に灌注する。

（４）カビによる苗立枯病の対策薬剤

	リゾープス菌	フザリウム菌	トリコデルマ菌	ピシウム菌
	30～40℃の高温多湿の場合で発生しやすく、培土上方にカビが発生する。 灰色カビ～白カビ	播種後低温（10℃以下）にあったり、土壌の乾湿を繰り返すと発生。 ピンクカビ～白カビ	高温多湿条件下で発生しやすいが緑化開始時の低温が発生を助長する。籾や床土にカビが発生。 青緑カビ～白カビ	出芽時・育苗期中に低温・過湿条件下で発生しやすい。地際部や根が褐変・腐敗し、綿状のカビが発生。 ムレ苗症状
ダコニール1000	○			
ダコレート水和剤	○	○	○	
ナエファインフロアブル	○	○		○
タチガレエースM液剤		○		○

フジワン粒剤の育苗箱施用（発根促進）

フジワン粒剤の処理方法

●処理時期：苗緑化始期（発芽後2～4日）
●薬　　量：25～50g／箱（フジワン粒剤3kgで約100箱）
●方　　法：均一散布後灌水し、薬剤をくずれさせる。



ジャンボタニシ食害防止の対策

～　防除に努めましょう　～





ジャンボタニシの対策について（秋冬期の対策）

1：石灰窒素の散布

①ジャンボタニシが活動する水温15℃以上の時期（10月頃まで）に、圃場に3～4㎝水を溜め、1～4日放置し、土の中の貝を地上に移動させます。

②次に石灰窒素を20～30kg（10a当り）散布し、3～4日間湛水状態を維持してください。
その後、自然落水させます。

注意1：石灰窒素は魚介類に影響があるため、水路に流れないようにしてください。
注意2：翌年水稲を作付する場合は、基肥の窒素成分を1kg（10a当り）程度、減肥してください。

2：冬期の耕うん

冬期の耕うんは、貝の粉砕と貝を地表に掘り出し、寒さに晒す効果があります。
なるべく、土壌が乾燥して固く、かつ気温が低い12月～1月頃に行ってください。
耕うんのポイント：①作業速度を通常より2～4割遅くし、回転数を早くすること。

注意3：耕うんを繰り返すと、掘り起こした貝を土の中に戻すこともあるので、2回目の耕うんはあまり効果がありません。

ジャンボタニシの対策について（移植時～）

●主なジャンボタニシ防除剤の特徴と使用方法

商品名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	効果	水管理	使用上のポイント
スクミンベイト3	発生時	2～4kg	－	食害防止	湛水散布	主に食害防止効果。 天然由来の成分で使用回数の制限がない。 水田全体に均一に散布。 千葉エコ米で使用出来ます!
スクミノン	収穫60日前まで	1～4kg (4kg推奨)	2回以内	殺貝	深水	中貝～大貝にも高い殺貝効果。 全面均一散布が基本。(スポット処理不可) 低温時には効果減少のおそれ有。
ジャンボたにしくん	収穫60日前まで	1～2kg	2回以内	殺貝	湛水散布	湛水管理をして、水田全体に均一散布してください。動力散布機でも散布できます。
キタジンP粒剤	本田初期	5kg	2回以内	食害防止 ～殺貝	浅水	小貝は殺貝、中貝以上は食害防止。 ごく浅くして水中の農薬濃度を高めると効果的です。(浅水でジャンボタニシの行動を鈍らせます)
パダン粒剤4	収穫30日前まで	4kg	6回以内	食害防止	浅水	主に食害防止効果。 ごく浅くして水中の農薬濃度を高めると効果的です。田植同時散布が効果的です。

長生地域水田ではジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）の発生が拡大しており、水稲では越冬貝により、田植直後の苗が食害されているなどの被害が発生しています。

ジャンボタニシの根絶は困難です。しかし、薬剤による防除や石灰窒素による防除・耕種的な対策を組み合わせることによって被害を軽減することができます。

なお、農薬の使用にあたっては、登録のある薬剤で安全使用基準を厳守して頂くと同様に、椿油かすには強い魚毒性があり、流出した場合魚介類に影響を及ぼします。

農薬取締法において、害虫駆除・防除を目的として使用することは処罰の対象となります。

カメムシ（斑点米）防除の対策

～　品質アップを目指そう　～



※実際の大きさとは異なります。



カメムシの対策について（農薬紹介と防除方法）

商品名	10a当りの使用量	使用時期(収穫前日数)	使用回数	使用上のポイント
スタークル豆粒	**250g**	**7日前まで**	**3回以内**	**出穂期～穂揃期に湛水状態で散布。**
スタークル粒剤	**3kg**			**※散布後7日間は落水やかけ流しはしないで下さい。**
キラップ粒剤	3kg	14日前まで	2回以内	出穂10日前～出穂期に湛水状態で散布。 ※散布後7日間は落水やかけ流しはしないで下さい。
トレボン粉剤DL	3kg～4kg	7日前まで	3回以内	カメムシがいた場合、
トレボン乳剤	希釈倍率2000倍	14日前まで	3回以内	直接付着させること。

防除方法

①豆つぶ・粒剤は穂揃期（8～9割ほど穂が出穂した状態）に薬剤を散布する。

➡豆つぶは4～7日前、粒剤は3～4日前に撒くと効果的です!

ホソハリカメムシ等の大型カメムシの場合は直接付着させる粉剤・液剤で防除すること。

②穂揃期後も発生が多い場合は、出穂期後15日頃に追加防除をおこなう。

③畦畔や周辺の休耕地の除草は、できれば出穂期2～3週間前と出穂期におこなう。

➡畦畔は、高刈り（5～10cmの高さ）で除草すること。

長生管内でも水稲航空防除が実施されていますが、航空防除後もカメムシ類の発生状況を確認し、飛来成虫また乳熟期以降の幼虫が多い場合は、追加で防除の実施を行ってください。


資料提供:千葉県農林総合研究センター・バイエルクロップサイエンス株式会社

土の健康診断してみませんか？

水田もOKです！

作物を正常に育成させるためには、土壌中の養分状態を作物の要求する量に調節するとともに、他の成分とのバランスをとらなければなりません。そのためには、土壌の不足する養分と過剰な養分を把握する【土壌診断】が必要です。
水田の秋落ち対策※1として、土壌の養分状態を知り、不足している養分を補うことで。収穫対策が出来ます！
JA長生では、土壌診断に基づいた適正な施肥を推進し、作物の収量安定、施肥コスト低減に取り組んでいます。
※1【秋落ちとは、稲作において登熟期以降に急激に生育が衰え、収量が低下する現象のこと】

リン酸、カリなどの養分が蓄積した圃場では、せっかくの施肥もムダになるし、作物の健康にも影響するんだ。



診断結果をもとに健康な土に生まれ変われば、施肥量を減らしても収量・品質はそのままか、それ以上に！

土壌養分の過不足がわかり、作物の収量・品質が安定・向上します。

基準より多い養分は減らして、少ない養分は増やすことで最適な土壌バランスに近づけることができ、作物の収量、品質が安定・向上します！

土づくり資材等の適切な投入量がわかり、施肥コストが減らせます！

土壌診断で資材の投入量がわかれば、無駄が省けて、その分だけ施肥コストを減らせます。

土壌サンプルの採り方


1 土を採る場所と時期

土のサンプルは中央と対角線の5カ所から採り、合わせて均一にしてください。
収穫後、次作の作業（耕起・施肥）に入る前に採取しましょう。



2 土の採り方

表土1㎝ぐらいを除いてから、深さ10～20㎝の作土を移植ゴテで採ります。



3 採取した土を乾かす

採取した土は、新聞紙などの上に薄く広げ、風通しの良いところで1週間くらい乾燥させます。



4 乾かした土を篩がけする

乾燥させた土を2㎜の目開きの篩に通して、細かい土を集めます。
篩の上に残った土は、軽く砕いて、また篩に通します。



5 サンプルを土壌採取袋に入れる

所定の土壌採取袋（封筒）に土のサンプルを入れ、必要事項を書き込んで、JAの担当職員へお渡しください。



土壌診断結果は、2週間～1か月程度かかります。

詳しくは、JA長生ホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

JA長生 営農販売部 担い手支援課
（長生農業独立支援センター）
TEL 0475-24-5700

南部営農購買センター
TEL 0475-42-4343

北部営農購買センター
TEL 0475-33-7007

西部営農購買センター
TEL 0475-35-3001

JA長生の コスト削減の取り組み

肥　料

肥料では、銘柄の集約・共同購入によってコスト削減に取り組んでいます!!

低コスト肥料ラインナップ



化成 16-16-16



化成 14-14-14



化成 8-8-8

一般作物向け



化成 14-18-14

水稲基肥向け



化成 17-0-17

水稲追肥向け

農　薬

農薬では、担い手直送規格（40kg）をご用意しております!!
ご自宅に直送いたします!!

担い手直送規格ラインナップ



ブーン®バディート®



キマリテ®



エンペラー®



コメット® 1キロ粒剤



キラリ® 1キロ粒剤




カチボシ®

対応品目拡大中!!

水稲育苗用培土

合成培土3号　20kg入・500kg入・1t入



N	P	K
0.04	0.08	0.05

1箱当り　2.7～3.0kg

商品特長

長年使い続けられている培土
健苗育成に最適
粒径が揃った高品質培土

サンアグロ

豊作培土　20kg入・500kg入



N	P	K
0.04	0.16	0.05

1箱当り　2.4～2.7kg

商品特長

容量重視(約24ℓ)
粒径を大きめに揃えた培土

サンアグロ

平成培土　20kg入・500kg入・1t入



N	P	K
0.04	0.08	0.05


1箱当り　3.0～3.5kg

商品特長

低価格培土
合成培土3号に比べ粒径が細かい

サンアグロ

水稲機械移植 育苗用肥料　1kg入



N	P	K
4	4	4

1箱当たり　30～40g

商品特長

水稲箱育苗用肥料
自家培土の肥料分として使用

大日本産肥

水稲用肥料【基肥　15kg袋】

コシヒカリ化成15　15kg入



N	P	K
10	26	16

10a当り　1.5～2袋

商品特長

コシヒカリの元肥
15kg軽量タイプ
別途追肥が必要

サンアグロ

ふさこがね化成15　15kg入



N	P	K
16	18	13

10a当り　2～3袋

商品特長

ふさこがねの元肥
15kg軽量タイプ
別途追肥が必要

サンアグロ

ふさおとめ化成15　15kg入



N	P	K
13	18	13

10a当り　2～3袋

商品特長

ふさおとめの元肥
15kg軽量タイプ
別途追肥が必要

サンアグロ



水稲用肥料【基肥一発　15kg袋】

15kgのメリットは
持ち運びしやすい！（軽い）
側条施肥機に入れる時
カンタン！
1袋換算しやすい！



コシヒカリ専用

コシヒカリ一発15　15kg入



N	P	K
20	16	14

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

コシヒカリの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

サンアグロ

スーパーてまいらずコシヒカリ　15kg入



N	P	K	苦土
20	13	12	3

10a当り　1.5～3袋

商品特長

速攻性窒素が約5割、緩効性窒素が約5割で追肥のいらない省力が可能なコシヒカリ用一発肥料

片倉コープアグリ

ツーコート一発コシヒカリ15　15kg入



N	P	K	苦土
20	11	12	1.5

10a当り　2～3袋

商品特長

コシヒカリの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ
カリ成分も生育後半まで持続
登熟向上を期待

サンアグロ

早生品種専用

ふさこがね一発15　15kg入



N	P	K
22	14	14

10a当り　2～3袋

商品特長

ふさこがねの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

サンアグロ

ふさおとめ一発15　15kg入



N	P	K
20	15	15

10a当り　2～3袋

商品特長

ふさおとめの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

サンアグロ

早生用一発15　15kg入



N	P	K
26	10	10

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

コシヒカリ以外の元肥一発肥料
15kg軽量タイプ
チッソ成分が高くコスト低減
微生物分解型の緩効性肥料含む

サンアグロ

スーパーてまいらず早生用　15kg入



N	P	K
27	10	8

10a当り　1～3袋

商品特長

速攻性窒素が約5割、緩効性窒素が約5割で追肥のいらない省力が可能な早生用一発肥料

片倉コープアグリ

水稲用肥料【基肥一発 20kg袋】

20kgのメリットは
リン酸・加里が多く入る!
全層施肥の場合、
まきムラが少ない!
側条時、メモリが
合わせやすい!



コシヒカリ専用

楽っ子コシヒカリ　20kg入



N	P	K	苦土
15	15	15	3

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

長年使い続けられている
コシヒカリの元肥一発肥料
20kgタイプ

サンアグロ

てまいらず464　20kg入



N	P	K	苦土
14	16	14	3

10a当り　1.5～3袋

商品特長

速攻性窒素が約5割、緩効性窒素
が約5割で追肥のいらない省力が
可能なコシヒカリ用一発肥料

片倉コープアグリ

ナイスワン844N　20kg入



N	P	K
18	14	14

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

砂地向けコシヒカリ用基肥一発
速効性窒素が約6割、緩効性窒素が
約4割で追肥のいらない省力型の
コシヒカリ専用一発肥料

セントラル化成

早生品種専用

てまいらずふさこがね　20kg入



N	P	K
20	15	12

10a当り　2.5～3.5袋

商品特長

速攻性窒素が約6割、緩効性窒素
が約4割で追肥のいらない省力が
可能なふさこがね用一発肥料

片倉コープアグリ

楽っ子ふさおとめ　20kg入



N	P	K	苦土
15	15	15	2

10a当り　2～2.5袋

商品特長

長年使い続けられている
ふさおとめの元肥一発肥料
20kgタイプ

サンアグロ

ふさこがね専用一発033N　20kg入



N	P	K
20	13	13

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

ふさこがね用基肥一発
速効性窒素が約6割、緩効性窒素
が約4割で追肥のいらない省力型
のふさこがね専用一発肥料

セントラル化成

ナイスワン（ふさおとめ）　20kg入



N	P	K
18	14	14

10a当り　2～3袋

商品特長

肥料が抜けやすい砂地用。速効性
窒素が約6割、緩効性窒素が約4割
で追肥のいらない省力型のふさお
とめ専用一発肥料。

セントラル化成

水稲用肥料【有機・飼料用米・ペースト・追肥肥料】

有機アグレット673　20kg入



N	P	K	苦土
6	7	3	1

10a当り　2～4袋

商品特長

化学肥料を使用していない
コシヒカリ用基肥です。
ちばエコ米適用肥料

朝日アグリア

飼料用米専用一発15　15kg入



N	P	K
26	10	10

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

飼料用米の元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

サンアグロ

ネオペースト1号　20kg入



N	P	K
12	12	12

10a当り　1～2袋

商品特長

液状側条施肥専用肥料。
ネオペーストの高成分肥料。

片倉コープアグリ

ネオペースト2号　20kg入



N	P	K
10	16	12

10a当り　1～2袋

商品特長

液状側条施肥専用肥料。
ネオペーストの低成分肥料。

片倉コープアグリ

ネオペーストSR502　20kg入



N	P	K
15	10	12

10a当り　1.5～2.5袋

商品特長

液状側条施肥専用肥料。
緩効性窒素入りで2段施肥機との
組み合わせで基肥一発施肥が可能

片倉コープアグリ

軽量追肥15　15kg入



N	P	K
22	2	14

10a当り　0.5～1袋

商品特長

コスト重視の水稲用追肥
15kg軽量タイプ

サンアグロ

園芸肥料【野菜向け】

強力ホルム野菜化成　20kg入



N	P	K
14	18	14

10a当り　2～3袋

商品特長

長年使い続けられている
野菜専用肥料
20kgタイプ
ゆっくりジワジワと効果を発揮

サンアグロ

ジシアン555　20kg入



N	P	K
15	15	15

商品特長

ジシアンの働きで窒素成分が
ゆっくり長効きする高度化成

片倉コープアグリ

園芸肥料【野菜向け】

SC36

20kg入



N	P	K
12	12	12

10a当り　2～4袋

商品特長

硫黄で被覆した黄色い肥料
20kgタイプ
チッソ・リン酸・カリ全てゆっくり効果を発揮（約90日）

サンアグロ

燐硝安加里1号

20kg入



N	P	K
15	15	12

10a当り　1～2袋(20～40kg)

商品特長

硝酸態窒素入り速効性肥料。
植物が好んで吸収する硝酸態窒素が約4割含まれる。
ネギや果菜類の追肥に最適。

ジェイカムアグリ

野菜美人

20kg入



N	P	K	ホウ素
10	10	10	0.2

商品特長

野菜専用肥料
ホウ素が入っているため、高温期に栽培するアブラナ科野菜に適した肥料

日本肥糧

SCねぎ専用047

20kg入



N	P	K
10	14	7

10a当り　2～4袋

商品特長

硫黄を好むネギ・ニンニク専用
20kgタイプ
チッソ成分の約8割はゆっくり効果を発揮（約140日）

サンアグロ

CDUタマゴS555

20kg入



N	P	K
15	15	15

10a当り　2～4袋(40～80kg)

商品特長

CDU入り緩効性肥料。
CDU態窒素が約5割含まれる。
基肥、追肥に最適。

ジェイカムアグリ

ちばやさい808

20kg入



N	P	K	苦土	ホウ素
8	10	8	2	0.2

商品特長

有機質約4割、苦土、ホウ素入り粒状品。
野菜用の低コスト化成肥料で、園芸全般に使用できます。

片倉コープアグリ

レオユーキM

20kg入



N	P	K
12	8	10

商品特長

有機約20%入り、
一般野菜向け肥料。

朝日アグリア

ほう素入野菜専用Dd404

20kg入



N	P	K	ホウ素
14	10	14	0.3

10a当り　1～2袋

商品特長

ホウ素が入った野菜専用追肥
20kgタイプ
すぐに効いて効果が持続

サンアグロ

園芸肥料【野菜向け】

スーパーエコロング413 140日　10kg入



N	P	K
14	11	13

10a当り　2～4袋（20～40kg）

商品特長

肥効調節型肥料。初期（約40日間）は溶出せず後半100日間で全体8割の肥料成分が溶出。
他70,100,180,220日タイプも。

ジェイカムアグリ

エコレット一発484　20kg入



N	P	K
14	8	14

商品特長

豚ぷん堆肥＋ロング肥料が組合さったエコレット。
肥効の期間:4ヶ月～5ヶ月
ネギ・果菜類向け

朝日アグリア

日の本3号　20kg入



N	P	K
8	7	6

商品特長

石灰窒素入りのため窒素の分解・流亡を抑え、やや長く効く肥料

片倉コープアグリ

野菜の達人　15kg入



N	P	K
15	14	10

10a当り　1～2袋

特長

すぐ効く野菜専用追肥
15kgタイプ
夜露でも溶ける肥料
寒い時でも効果を発揮

サンアグロ

有機アグレットS300　20kg入



N	P	K
3	10	10

商品特長

有機約50%入り粒状タイプのサツマイモ専用肥料。

朝日アグリア

落花生専用550　20kg入



N	P	K
5	15	20

10a当り　3～5袋（60～100kg）

商品特長

落花生専用肥料。
豆類にも最適。

ジェイカムアグリ

有機入SC玉ねぎ専用16号　20kg入



N	P	K
16	11	10

10a当り　6袋

商品特長

硫黄を好む玉ねぎ専用肥料
20kgタイプ
硫黄被覆尿素入り
動物由来の有機を多く含む

サンアグロ

豆プロ一発　20kg入



N	P	K
25	10	8

10a当り　1～1.5袋（20～30kg）

商品特長

大豆、枝豆向け一発肥料。
窒素成分の約7割が緩効性肥料

ジェイカムアグリ

園芸肥料【野菜向け】

エコレット808　20kg入



N	P	K
8	10	8

商品特長

豚ぷん堆肥を約50%使用することで低コスト化を実現。粒状のため、まきやすく機械散布も可能。あらゆる作物に使用出来ます。

朝日アグリア

はつらつ君666　20kg入



N	P	K
6	6	6

商品特長

全窒素のうち、約半分がアミノ酸の液肥。
トマト・イチゴなどの施設園芸向け

朝日アグリア

ながいきねぎ専用　20kg入



N	P	K	苦土	ホウ素
10	12	8	1	0.005

商品特長

JA長生オリジナルながいきねぎ専用肥料。140日タイプの被覆窒素とジシアン化成、有機肥料を配合。

片倉コープアグリ

畑楽くん　20kg入



N	P	K	苦土	マンガン	ホウ素
12	2	8	1	0.1	0.05

商品特長

被覆肥料(30日・90日)、有機約25%、微量要素入りの省力肥料。園芸作業の基肥・追肥に使えます。

朝日アグリア

園芸追肥

NKグリーン30号　20kg入



N	P	K
16	0	14

10a当り　1～2袋

商品特長

長年使い続けられている
野菜専用追肥
20kgタイプ
玉ねぎ・そら豆等幅広く使用

サンアグロ

野菜追肥専用S842　20kg入



N	P	K
18	4	12

商品特長

追肥専用肥料。
植物が好んで吸収する硝酸態窒素が約5割含まれる。

ジェイカムアグリ

その他園芸培土

ニッピ良菜培土SP200　15kg入



N	P	K	苦土	
200	2500	200	200	(mg/ℓ)

商品特長

腐植質を入れ、軽く保水性の良い葉菜向け培土
約25ℓ

日本肥糧

げんきくん果菜200　20kg入



N	P	K	
200	3000	150	(mg/ℓ)

商品特長

粉・粒状の土に肥料成分、木質炭、ピートモスを混合した透水性・保水性に優れた培土
約26ℓ

片倉コープアグリ

土づくり資材【石灰・窒素・苦土肥料】

苦土石灰（粉）

20kg入



アルカリ	苦土
55	11

10a当り120～160kg

商品特長

粉状品
苦土入り石灰資材
畑作の養分に必要な石灰と苦土を補給します。

吉澤石灰

粒状 苦土石灰

20kg入



アルカリ	苦土
55	10

10a当り120～160kg

商品特長

粒状品
苦土入り石灰資材
畑作の養分に必要な石灰と苦土を補給します。

吉澤石灰

消石灰P-70

20kg入



アルカリ
70

10a当り60～200kg

商品特長

粉状品。酸性土壌の矯正、石灰の補給をします。
酸性の強い土壌:120～200kg
酸性の弱い土壌: 60～100kg

吉澤石灰

顆粒消石灰ホープ

20kg入



アルカリ
72

10a当り60～200kg

商品特長

顆粒品。酸性土壌の矯正、石灰の補給をします。
酸性の強い土壌:120～200kg
酸性の弱い土壌: 60～100kg

吉澤石灰

畑のカルシウム

20kg入



カルシウム
28.5

商品特長

水溶性カルシウムを約26%含んだ作物のカルシウム欠乏対策や根張り改善に適した肥料

片倉コープアグリ

粒状貝化石

20kg入



アルカリ
35

10a当り　3～5袋

商品特長

ゆっくり効く土壌改良資材
20kgタイプ
各種ミネラルを豊富に含む

サンアグロ

尿素

20kg入



N
46

商品特長

水に溶けやすいチッソ肥料
20kgタイプ

サンアグロ

硫安（細粒）

20kg入



N
21

商品特長

21%全量アンモニア態の速効性窒素肥料。
硫酸の効果によりpHを下げる効果がある

新ケミカル商事

土づくり資材【窒素・苦土肥料・リン酸・ケイ酸】

石灰窒素（粒） 20kg入



N
20

商品特長

土に成分が吸着されるため環境への影響が少なく長効きの窒素肥料
水田刈り取り後の稲ワラ腐熟促進、ジャンボタニシへの農薬登録あり

片倉コープアグリ

硫マグ（粒） 20kg入



苦土
25

商品特長

葉緑素の基、速効性苦土資材
基肥・追肥問わず施肥可能。

ナイカイ商事

過石（粒）17.5% 20kg入



P
17.5

商品特長

水溶性の速効性リン酸資材

片倉コープアグリ

苦土過石（粒） 20kg入



P	苦土
17	3.5

商品特長

く溶性苦土入り
リン酸資材

片倉コープアグリ

粒状ようりん 20kg入



P	苦土
20	12

商品特長

粒状品。
ゆっくり溶け出すリン酸資材。

朝日アグリア

粒状BMようりん 20kg入



P	苦土	マンガン	ホウ素
20	12	1	0.5

商品特長

粒状品。
ゆっくり溶け出すリン酸資材
ホウ素・マンガン等微量要素入り。

朝日アグリア

苦土重焼燐 20kg入



P	苦土
35	4.5

商品特長

早効き・遅効きの2種類のリン酸を含み、生育初期から後期まで肥効が持続する高性能リン酸資材

小野田化学工業

ケイカル（粒） 20kg入



ケイ酸	苦土
30	5

商品特長

粒状品
健康な稲作りに必要なケイ酸を補給
秋～冬に施用が効果的

村樫石灰工業

土づくり資材【リン酸・加里・ケイ酸・微量要素材】

農力アップスーパー60　20kg入



ケイ酸	アルカリ	苦土	マンガン
20	40	1	2

10a当り　3袋（60kg）

商品特長

ケイ酸の吸収利用率が高く、倒伏しにくい健康な稲づくりに効果的。含有する鉄・マンガンが根を守ります。

産業振興

けい酸加里　20kg入



加里	ケイ酸	苦土	ホウ素
20	34	4	0.1

商品特長

（水稲・園芸向け肥料）
ゆっくり効くカリとケイ酸が、高温障害対策、倒伏軽減に役立ちます。基肥施肥も可能。

開発肥料

マルチサポート2号　20kg入



苦土	ケイ酸	マンガン	ホウ素
12	20	0.2	0.2

商品特長

苦土、ケイ酸、微量要素がバランスよく配合されており、倒伏軽減、登熟向上が期待できます。
基肥・中間追肥どちらも施用可。

小野田化学工業

まかい4　20kg入



P	苦土	マンガン	ホウ素	アルカリ
5	10	0.2	0.1	45

商品特長

ようりん・苦土石灰・微量要素・腐植酸の4種類が1粒になった、まきやすい土壌改良資材。

朝日アグリア

粒状フミンPS23号　20kg入



P	苦土	アルカリ
5	7	40

商品特長

粒状品ようりんとケイカルを混合した土壌改良資材。

朝日アグリア

ハイフミンハイブリッド　20kg入



土壌改良資材

商品特長

良質な腐植物質を豊富に含んでいるので、根の活性・根張りを良くします。有用微生物のトリコデルマ菌の働きにより微生物環境改善・作物活性促進

日本肥糧

レオグリーン特号　20kg入



ペレット型堆肥

10a当り　約10袋

商品特長

省力的堆肥
腐植酸の効果で根張り、肥料のもちの向上が期待できる

朝日アグリア

ネバリン　20kg入



使用量　畑：4～5袋/10a
　　水田：2～3袋/10a

商品特長

水溶化腐植入り土壌改良資材
腐植酸の溶出がゆっくり長期間継続します。健全な根張りと生育、品質・収量アップ

日本肥糧

土づくり資材【堆肥・有機質資材】

小櫃発酵ケイフン（細粒） 15kg入



商品特長

中温発酵によってできた有機肥料ですから、有効微生物を増殖し土壌を肥沃にします。

JAきみつ

菜種油粕 20kg入



N	P	K
5.3～5	2	1

商品特長

一般的な有機質肥料

Jオイルミルズ

みのり堆肥 20kg入



商品特長

樹皮を高温発酵、熟成した堆肥。

富士見工業

牧場のめぐみ 17kg入



商品特長

微生物の働きにより、
土が元気になり果樹・野菜にも
効果を発揮します。

鈴木産業

お問い合わせは各センターへ。



獣害対策お済みですか？御見積もお気軽に!!

大規模水稲農家の皆様へ
お得なご提案！

メガ得
担い手直送でお買い得!!
JAグループ

目印はメガぞう君

担い手直送規格

続々登場!!

JAグループでは、「農家手取り最大化」に向けた農薬分野でのコスト低減策の一つとして、
大規模農家の皆様が低価格を実感できる特別大型規格品をご用意しました。

水稲用一発除草剤



10kg
4ha分

プライオリティ®



20kg×2
4ha分

エンペラー®
1キロ粒剤



20kg×2
4ha分

水稲用初・中期一発除草剤
パワーウルフ
1キロ粒剤51



20kg×2
4ha分

コメット®1キロ粒剤



20kg×2
4ha分

バッチリLX®
1キロ粒剤



20kg×2
4ha分

カヨガード
1キロ粒剤

対応品目拡大中！

価格やラインナップ、注文につきましてはお近くのJAへお問い合わせください！

※商品写真はイメージのため、現物と異なる場合があります。

●完全受注生産で、農家の皆様へ直送！

商品は、専用注文書による完全受注生産品で、ご注文いただいた農家の皆様には、ご指定の場所へ直接配送いたします。



完全受注生産、ご指定の場所への直接配送など徹底した物流コストの削減により低価格を実現しました。

JAグループ
農協 全農 経済連

水稲育苗消毒剤【育苗箱・培土・育苗】

イチバン　500ml



水150リットル当り
150ml～300ml
使用時期:育苗箱の消毒

商品特長

育苗箱消毒用資材です
瞬時浸漬または散布（ジョロ散布）にて育苗箱の消毒ができます
水洗、乾燥の必要がなく直ちに次の作業に移れます

OATアグリオ

ヘルシードTフロアブル　100ml・500ml



希釈倍数:200倍
使用時期:浸種前
使用方法:24時間浸漬

商品特長

種子伝染性のばか苗病や苗立枯病の種子消毒剤
糸状菌病害から細菌性病害まで効果を示す

北興化学

テクリードCフロアブル　100・500ml



希釈倍数:200倍
使用時期:浸種前
使用方法:24時間浸漬

商品特長

ばか苗病を強力に抑える種子消毒剤
種子に浸透する力が強いため、陰干しの作業を省いてもOK。
また、水交換による効果変動が少ないのも特長です。

クミアイ化学

フタバロンA粉剤　500g



覆土1L当り5g
使用時期:覆土前
使用方法:覆土に均一に混和

商品特長

カスミンとダコニールの混合剤
育苗中に発生する苗立枯病（リゾープス菌）、もみ枯細菌、苗立枯細菌病に有効

北興化学

カスミン液剤　500ml・20L



希釈倍数:4～8倍（5倍がおすすめ）
使用時期:覆土前

商品特長

箱育苗で発生する各種細菌病（もみ枯細菌病）に対して高い効果を示す。いもち病にも効果。

北興化学

ナエファインフロアブル　100ml



希釈倍数:2000倍
使用液量:育苗箱1箱当り1ℓ
使用時期:は種時～緑化期

商品特長

苗立枯病菌（ピシウム、リゾープス、フザリウム）に高い効果を示すだけでなく育苗箱内の根張りが向上し健苗が生育。田植え直後の活着を促進します！

クミアイ化学

タチガレエースM粉剤　1kg



使用量:育苗箱1箱当たり6～8g
使用時期:は種前

商品特長

苗立枯病などの防除
優れた健苗育成効果
ムレ苗防止に安定した効果

三井化学アグロ

ダコレート水和剤　100g



希釈倍数：800～1200倍
使用液量：育苗箱1箱当り1ℓ
使用時期：は種時～緑化期
但し、は種14日後まで

商品特長

ダコニールとベンレートを配合した苗立枯病防除剤。予防と治療の両面のはたらきで的確な防除効果を示します。

クミアイ化学

水稲育苗消毒剤【育苗箱・培土・育苗】

ダコニール1000　250ml・500ml



希釈倍数:1000～2000倍
使用液量:育苗箱1箱当り1ℓ
使用時期:は種時～緑化期
但し、は種14日後まで

商品特長

水稲育苗では、苗立枯病菌（リゾープス）に高い効果。より強力な苗立枯病対策として、ナエファインフロアブルとの混用をお勧めします。

クミアイ化学

フジワン粒剤　3kg



50g/育苗箱1箱
使用時期:緑化期から移植直前まで
10a当り:3～5kg（いもち病）
初発7～10日前（葉いもち）

商品特長

苗質向上、ムレ苗防止、根の伸長および発根促進、登熟歩合向上などの効果が期待できます
いもち病に優れた予防効果を発揮します

日本農薬

水稲育苗箱施用剤

プリンス粒剤　1kg・10kg



50g/育苗箱1箱
使用時期:は種前～移植当日

商品特長

播種時から使用でき、また播種前の床土混和処理も可能
初期害虫からチョウ目害虫などに対し優れた効果

北興化学

アドマイヤーCR箱粒剤　1kg



50g/育苗箱1箱
使用時期:は種時（覆土前）～移植当日

商品特長

新製法「CR（コントロール・リリース）」により、播種時から移植当日まで幅広い使用時期でお使い頂けます。イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類に対し高い防除効果を発揮します。

クミアイ化学

ブーンパディート箱粒剤　1kg



50g/育苗箱1箱
使用時期:は種時（覆土前）～移植当日

商品特長

新規の抵抗性誘導型殺菌剤“ブーン”を配合し、いもち病に高い効果を示す待望の新商品!初期害虫、チョウ目害虫にも優れた効果と長い残効性が特長です。

クミアイ化学

エバーゴルフォルテ箱粒剤　1kg・10kg



50g/育苗箱1箱
使用時期:は種時（覆土前）～移植当日

商品特長

苗箱処理で紋枯れ病が防除できる新規剤。いもち病も同時防除できるほか、イネの主要害虫に対しても優れた効果を発揮します。
長い残効性が特長です。

クミアイ化学

バリアード箱粒剤　3kg



50g/育苗箱1箱
使用時期:移植2日前～移植当日

商品特長

水稲初期害虫を同時防除できます
カーバメイト剤抵抗性のイネドロオイムシに優れた効果を示します

日本農薬

オンコル粒剤5　3kg



50g/育苗箱1箱
使用時期:移植3日前～移植当日

商品特長

イネミズゾウムシ・イネドロオイムシの育苗箱防除剤
3kg、1袋で育苗箱60枚に使用できます

OATアグリオ

水稲育苗箱施用剤

パダン粒剤4 3kg



50g～100g/育苗箱1箱
使用時期:は種前又は移植当日

商品特長

イネドロオイムシ、イネミズゾウムシなど初期害虫防除の安価な殺虫剤。
ジャンボタニシ(食害防止)の効果あり。

協友アグリ

ワンリード箱粒剤08 3kg



50g/育苗箱1箱
使用時期:は種時(覆土前)～移植当日

商品特長

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシに対して長期間にわたって優れた効果を発揮します。

クミアイ化学

水稲除草剤【初期剤】

サキドリEW 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:植代後～移植前7日、または移植直後～ノビエ1葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

初期剤成分のエース格(ブタクロール+ペントキサゾン)同士の組合せで、発生前のノビエ・コナギ・ホタルイ・アゼナに高い効果。雑草イネ対策剤としても有効です。

クミアイ化学

ユニハーブフロアブル 500ml



10a当り:500ml
使用時期:植代時～移植7日前又は移植時～ノビエ1葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエをはじめアゼナやホタルイにも高い効果
オモダカ防除に特にお奨めの初期剤

北興化学

エリジャン乳剤 300ml



10a当り:300ml
使用時期:植代後～移植7日前又は移植直後～ノビエ1葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

低コストの初期除草剤
初中期一発剤・中期剤との体系処理でおすすめ!
ノビエ・ホタルイ・アゼナなどに高い効果!

シンジェンタジャパン

ダッシュワンフロアブル 500ml



10a当り:500ml
使用時期:植代時～移植7日前又は移植時～ノビエ1葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエ、ホタルイに高い効果
クログワイ防除に特にお奨めの初期剤。

北興化学

水稲除草剤【初中期一発 フロアブル】

トップガンLフロアブル 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

難防除雑草への効果が高い4成分除草剤。
ノビエにも3葉期までの効果があり、田植同時処理が可能です。

クミアイ化学

サラブレッドKAIフロアブル 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに長期残効の低コスト一発剤。
ピラクロニル原体配合で幅広い雑草に優れた効果あり。
大型規格2L(40a分)あり

協友アグリ

水稲除草剤【初中期一発 フロアブル】

バッチリLXフロアブル 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

バッチリ効果にノビエの残効性を更に強化した4成分の一発剤。ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、クサネム、コナギなど優れた効果あり。
大型規格2L(40a分)あり

協友アグリ

カチボシLフロアブル 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに70日間の長期残効。
ホタルイ、クログワイ等の多年生雑草、イボクサ、クサネム等にも高い効果。
田植え同時処理可能。

北興化学

カウントダウンフロアブル 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

高葉齢ノビエへの殺草力と長期残効。
難防除雑草のホタルイ・オモダカ・コウキヤガラ・クログワイへの高い除草効果。水稲に高い安全性。
雑草イネ対策にも有効。

バイエルクロップサイエンス

プライオリティフロアブル 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

強力且つ長期残効の2成分剤
ホタルイは強力に作用するほか、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ等の塊茎形成やキシュウスズメノヒエ、イボクサ等の侵入も抑制!

クミアイ化学

エンペラーフロアブル 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

高機能3成分剤
早めに効くノビエの成分と遅く効くノビエの成分の組合せで、長期間のノビエ対策が実現。発生前の藻類も抑えます。

クミアイ化学

シグナスフロアブル 500ml・2.5L



10a当り:500ml
使用時期:移植後1日～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに長期残効。アルテア配合でホタルイ、クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに優れた効果。
大規模用2.5Lボトルあり。

日産化学

ボデーガードプロフロアブル 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ3.5葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

コウキヤガラ・オモダカ・クログワイに高い除草効果。塊茎形成抑制効果により、翌年の発生量も抑える。
畦畔雑草のアシカキ・イボクサ・クサネム・キシュウスズメノヒエにも有効。ノビエへは長期残効。

バイエルクロップサイエンス

ディオーレフロアブル 500ml



10a当り:500ml
使用時期:移植後3日～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

アルテア10g配合でホタルイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラなどの難防除雑草への効果を強化。オキサジクロメホン配合でノビエの残効も強化。

日産化学

水稲除草剤【初中期一発 フロアブル】

カイリキZフロアブル　500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植後3日～ノビエ3葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに長期残効を有します。
クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ等の多年生雑草、クサネム、イボクサ等の特殊雑草にも高い効果があります。

北興化学



水稲除草剤【初中期一発 粒剤】

ドローン対応商品には、のマークが記載されています!

トップガンGT 粒剤　1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

難防除雑草への効果が高い4成分除草剤。
ノビエにも3葉期までの効果があり、田植同時処理が可能です。

クミアイ化学

サラブレッドKAI 粒剤　1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに長期残効の低コスト一発剤。
ピラクロニル原体配合で幅広い雑草に優れた効果あり。大型規格10kg（1ha分）担い手規格40kg（4ha分）あり

協友アグリ

バッチリLX粒剤　1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

バッチリ効果にノビエの残効性を更に強化した4成分の一発剤。
ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、クサネム、コナギなど優れた効果あり。大型規格10kg（1ha分）担い手規格40kg（4ha分）あり。

協友アグリ

カチボシ粒剤51　1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに70日間の長期残効
ホタルイ、オモダカ、クログワイ等の多年生雑草、イボクサ、クサネム等にも高い効果
田植同時処理可能!

北興化学

センイチMX粒剤　1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期まで
但し、収穫60日前まで

商品特長

幅広い使用時期が魅力!イボクサ・藻類も抑制。田植同時・直播・WCS・ドローンもOK!速効的でフォロー剤としても有効!

石原バイオサイエンス

プライオリティ粒剤　1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

強力且つ長期残効の2成分剤
ホタルイは強力に作用するほか、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ等の塊茎形成やキシュウスズメノヒエ、イボクサ等の侵入も抑制!田植同時可!

クミアイ化学

水稲除草剤【初中期一発 粒剤】

ドローン対応商品には、のマークが記載されています！

ディオーレ粒剤 1kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

アルテア10g配合でホタルイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラなどの難防除雑草への効果を強化。オキサジクロメホン配合でノビエの残効も強化。
田植同時にも使用可能です。

日産化学

エンペラー粒剤 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期
但し、収穫75日前まで

商品特長

高機能3成分剤。田植え同時可能。早めに効くノビエの成分と遅く効くノビエの成分の組合せで、長期間のノビエ対策が実現。発生前の藻類も抑えます。

クミアイ化学

シグナス粒剤 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに残効長く、田植え同時に最適な除草剤。「アルテア」配合でホタルイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラなどの難防除雑草にも効果が高い。イボクサにも有効。
大型規格10kg(1ha)もあります。

日産化学

ボデーガードプロ粒剤 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

次世代型除草剤。新規「トリアファモン」配合。
コウキヤガラ・オモダカ・クログワイに高い除草効果（塊茎形成も抑制）。畦畔雑草のアシカキ・イボクサ・クサネム・キシュウスズメノヒエにも有効。ノビエに長期残効

バイエルクロップサイエンス

ウルフエース粒剤17 3kg



10a当り:3kg
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

低価格帯でありながら幅広い種類の雑草に優れた効果と、水稲に対する安全性が高い、ロングセラーの一発除草剤です。

クミアイ化学

スパークスター粒剤 3kg



10a当り:3kg
使用時期:移植後5日～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

藻・表層剥離の予防効果が高いジメタメトリン配合、クログワイ防除は初期剤との体系で高い効果

日産化学

クサウェポン粒剤 1kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

長生管内で問題となっている、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ、オモダカに対し効果があります。
白化して枯らすので効果を実感でき、フロアブル、ジャンボもあります。

三井化学アグロ

ゼータジャガー粒剤 1kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ4葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

移植時～ノビエ4葉期まで幅広い時期に使用できる除草剤。
生育の進んだコウキヤガラにも有効です。
高葉齢の雑草にも効果が期待できるため、初期剤との体系処理にも対応可能。

住友化学

水稲除草剤【初中期一発 ジャンボ剤】

トップガンLジャンボ　250g



10a当り:250g
使用時期:移植後3日～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

難防除雑草への効果が高い4成分除草剤。ノビエにも2.5葉期までの効果があります。

クミアイ化学

バッチリLXジャンボ　400g・4kg



10a当り:400g(40g×10パック)
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期まで
但し、移植後30日まで

商品特長

バッチリ効果にノビエの残効性を更に強化した4成分の一発剤。ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、クサネム、コナギなど優れた効果あり。大型規格4kg(1ha分)担い手規格16kg(4ha分)あり。

協友アグリ

センイチMXジャンボ　500g



10a当り:500g(50g×10パック)
使用時期:移植後1日～ノビエ3.5葉期まで
但し、収穫60日前まで

商品特長

幅広い使用時期が魅力!イボクサや藻類も抑制。投げやすい50gパック。直播・WCSもOK。速効的でフォロー剤としても有効。

石原バイオサイエンス

ボデーガードプロジャンボ　300g



10a当り:300g(パック10個)
使用時期:移植後5日～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

次世代型除草剤。新規「トリアファモン」配合。コウキヤガラ・オモダカ・クログワイに高い効果(塊茎形成も抑制)。畦畔雑草のアシカキ・イボクサ・クサネム・キシュウスズメノヒエにも有効。ノビエに長期残効

バイエルクロップサイエンス

プライオリティジャンボ　250g・2.5kg




10a当り:250g
使用時期:移植直後～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

強力且つ長期残効の2成分剤
ホタルイは強力に作用するほか、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ等の塊茎形成やキシュウスズメノヒエ、イボクサ等の侵入も抑制!

クミアイ化学



水稲除草剤【中後期粒剤】

ドローン対応商品には、のマークが記載されています!

マメットSM粒剤　1kg・10kg

2022年販売終了。予約注文書のみの取扱となります。



10a当り:1kg
使用時期:移植後15日～ノビエ3.5葉期まで(稲5葉期以降)但し、収穫60日前まで

商品特長

有効成分の相乗効果によりSU抵抗性雑草にも高い効果を示す。また、アオミドロ、藻類による表層はく離にも効果あり。
大型規格10kg(1ha分)あり

協友アグリ

レブラス粒剤　1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植後14日～ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで

商品特長

多年生雑草に強い「アルテア」配合。クログワイ30cm、オモダカは矢尻葉3葉期まで。ホタルイ花茎10cm、コナギ6葉期、コウキヤガラ30cmまで効果を発揮。

日産化学

水稲除草剤【中後期粒剤・藻の発生時】

ドローン対応商品には、のマークが記載されています！

アトトリ豆つぶ250　250g



10a当り：250g（湛水散布）
使用時期：移植後14日（稲5葉期以降）～ノビエ4葉期
但し、収穫45日前まで

特長

オモダカ矢尻葉3葉期、クログワイ、コウキヤガラは草丈30cm、ノビエは4葉期まで有効!畦畔からひしゃく状器具で簡単に撒けます。
ドローン散布も可能。

クミアイ化学

ツイゲキ豆つぶ250　250g



10a当り:250g（湛水散布）
使用時期:移植後20日（稲5葉期以降）～ノビエ4葉期　但し、収穫75日前まで

商品特長

アトトリ1袋分と15cm程度のホタルイを強力に抑える成分を組合せたハイスペックな新中後期剤!。
除草効果もパワーUPしています。
ドローン散布可能!

クミアイ化学

シアゲMF粒剤　1kg



10a当り：1kg
使用時期：移植後20日～ノビエ4葉期まで。
但し、収穫60日前まで。

商品特長

4葉期までのヒエを枯らす。
ホタルイ10cm、クログワイ30cm、オモダカ矢じり葉3葉期まで枯らす。

三井化学アグロ

レブラスジャンボ　400g



10a当り：400g
使用時期：移植後14日～ノビエ4葉期
ただし、収穫60日前まで

商品特長

中後期でも省力化！アルテア配合の"レブラス"にジャンボ剤が登場。
ホタルイ花茎10cmまで、コナギ6葉期、クログワイ30cm、コウキヤガラ30cm、オモダカ矢尻葉3葉期まで効果を発揮。

日産化学

トドメMF乳剤　200ml



10a当り：200ml
使用時期：移植後14日～ノビエ7葉期まで。
但し、収穫50日前まで

商品特長

7葉期までのヒエを枯らす。
処理層を形成し、残効2週間あり。

三井化学アグロ

クリンチャーバスME液剤　500ml



10a当り:1000ml（水100Lに本剤2本）
使用時期:移植後15日～ノビエ5葉期まで（収穫50日前まで）

商品特長

クリンチャーとバサグランの混合剤で、ノビエ及び広葉雑草の取りこぼした雑草対策に有効な茎葉処理除草剤です。落水及び浅水状態で散布
※展着剤加用不可

北興化学

モゲトン粒剤　3kg




10a当り:2～3kg
使用時期:ウキクサ類、藻類の発生始～発生盛期
但し、収穫45日前まで

商品特長

ウキクサ類、藻類、表層剥離の予防・治療剤（晴天時使用）
使用回数は3回まで

アグロカネショウ



水稲用殺虫剤【ジャンボタニシ食害防止・カメムシ防除】

ドローン対応商品には、のマークが記載されています！

スクミノン　2kg



10a当り:1～4kg
使用時期:収穫60日前まで（2回以内）

商品特長

ジャンボタニシが摂食後30分で麻痺を引き起こし、24時間後にはほぼ死滅します。基本は均一散布ですが、水口周辺や深水の場所には所定の範囲内で多めの散布も有効です。ドローン散布可。

クミアイ化学

ジャンボたにしくん　2kg



10a当り:1～2kg
使用時期:収穫60日前まで（2回以内）

商品特長

ジャンボタニシに対して優れた殺貝効果を示します。粒が細かく（粒径2～3mm）、散布機での散布が可能です。粒数が多く、安定した効果を発揮します（144,000粒／袋）。

住友化学

スクミンベイト3　2kg



10a当り:2～4kg
使用時期:発生時

商品特長

ジャンボタニシに対し殺貝・食害防止のダブル効果があります。
使用時期・使用回数の制限がありません。有機JAS登録あり。

三井化学アグロ

スタークル粒剤　3kg



10a当り:3kg
使用時期:収穫7日前まで

商品特長

各種カメムシ類に高い効果
速やかに稲体内に吸収され、斑点米を抑制
出穂期（全体の40～50%の穂が出た状態）が散布適期

北興化学

スタークル豆つぶ　250g



10a当り:250g
使用時期:収穫7日前まで

商品特長

圃場に入らず畦畔かららくらく散布
簡単にカメムシ防除ができます。
出穂3日～7日後までが散布適期です。浅めの湛水状態で散布してください。

クミアイ化学

キラップ粒剤　3kg



10a当り:3kg
使用時期:出穂10日前～出穂期（収穫14日前まで）

商品特長

幅広いカメムシ種に高い効果。
効果が持続するので、散布適期幅が広く、防除適期を外すことが少ない使いやすい薬剤です。

バイエルクロップサイエンス

トレボン粉剤DL　3kg



10a当り:3～4kg
使用時期:収穫7日前まで

商品特長

カメムシを含む水稲の主要害虫に対して幅広い効果があります。
速効的なノックダウン効果を示し、高い殺虫効果を示します。

クミアイ化学

ブラシントレボン粉剤DL　3kg



10a当り:3～4kg
使用時期:収穫7日前まで

商品特長

いもち病に対する予防・治療効果を兼ね備え、ごま葉枯病にも効果。
斑点米カメムシ類（4kg/10a）を始めとする本田害虫対策に！

北興化学

水稲用殺菌剤【いもち病・紋枯れ病・稲こうじ病】

ドローン対応商品には、のマークが記載されています！

フジワンモンカット粒剤 3kg



10a当り:3～4kg
使用時期:出穂30～10日前
但し、収穫30日前まで

商品特長

いもち・紋枯病に対し、優れた防除効果と残効性が期待できます
手軽で省力的な本田処理粒剤です
稲こうじ病にも有効（4kg/10a）

日本農薬

オリブライト250G豆つぶ 250g



10a当り:250g
使用時期:出穂10日前まで
但し、収穫45日前まで

商品特長

圃場に入らず畦畔かららくらく散布
高い予防効果で、いもち病と紋枯れ病、穂枯れ（ごま葉枯病菌）の防除ができます。ドローン散布可。

クミアイ化学

モンガリット粒剤 3kg



使用量:10a当たり3～4kg
使用時期:収穫45日前まで

商品特長

稲の紋枯病・稲こうじ病等に有効
稲での使用時期は出穂2～3週間前

三井化学アグロ

ブラシン粉剤DL 3kg



使用量:10a当たり3～4kg
使用時期:収穫7日前まで

商品特長

いもち病に対して治療・予防効果がある
ごま葉枯病や穂枯れ性病害にも有効

北興化学

茎葉処理除草剤

タッチダウンiQ 6L 他



希釈倍数:25～100倍

商品特長

2つの展着成分が高い除草効果を発揮!
散布後3日～7日で枯れ始め、根までしっかり浸透し、約60日間雑草を抑制します。
効果とコストで選ぶなら。

シンジェンタジャパン

ラウンドアップマックスロード 5.5L 他



希釈倍数:25～100倍

商品特長

スギナ25倍5月散布、多年生雑草50倍、一年生雑草100倍に希釈し茎葉に散布します
葉に散布された薬剤は速やかに吸収され植物体内を移行し根まで枯らします。

日産化学

バスタ液剤 2.2L 他



10a当り:500ml～1000ml
使用時期:水田畦畔、収穫7日前まで
（雑草生育期:草丈30cm以下）

商品特長

バスタ®液剤は幅広い種類の雑草に高い効果を示す非選択性の茎葉処理型除草剤です。オヒシバ、オオアレチノギクに高い効果！90作物以上に農薬登録あり！

BASFジャパン

プリグロックス 1L・5L



希釈倍数:50～100倍

商品特長

かかった所だけ枯れるので、畝間や斜面の雑草防除に最適。
ヒエの多い圃場に稲刈取後散布で、翌年の発生密度を減らします。

シンジェンタジャパン

茎葉処理除草剤・その他

ザクサ液剤　5L・他



希釈倍数:100～200倍
使用時期:水田畦畔収穫7日前まで

商品特長

スギナ、ツユクサに100倍で効果
水田畦畔ではダイロンゾルとの
混用がお奨め（右記参照→）
野菜の登録もあります

北興化学

ダイロンゾル　500ml



希釈倍数:400倍
使用時期:雑草発生前～雑草生育初期

商品特長

水田畦畔にて、雑草発生初期まで
の使用、又は雑草生育期にザクサ
液剤（100倍）との混用で除草作業
の回数減に繋がります。

北興化学

共同購入トラクター



基本型式 **SL33L**

中型クラス 33馬力

型式:SL33LFMAEP
ロプス仕様
メーカー希望小売価格
313.5万円（税込）

大容量48L燃料タンク

概ね1日無給油での作業が可能

ノークラッチ変速

ノークラッチで増減速、前後進切替が可能







型式 SL33LFQMAEP
キャビン仕様
メーカー希望小売価格 395.7万円（税込）



型式 SL33LFQMAEPC2P
半クローラ・キャビン仕様
メーカー希望小売価格 453.6万円（税込）

詳しくは農機センター（TEL46-0024）へお尋ねください。

育苗用パイプハウスセット

	ハウス断面図	間口×奥行	坪数	育苗箱入数	セット内容
M-12型ハウス	曲パイプ寸法／19.1×1.2×3.7 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	2間×3間	6坪	約56枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 3尺×6尺 ●組み立て部品一式
		2間×4間	8坪	約80枚	
		2間×5間	10坪	約104枚	
		2間×6間	12坪	約128枚	
M-15型ハウス	曲パイプ寸法／19.1×1.2×3.9 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	2.5間×4間	10坪	約120枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 3尺×6尺 ●組み立て部品一式
		2.5間×5間	12.5坪	約156枚	
		2.5間×6間	15坪	約192枚	
		2.5間×8間	20坪	約264枚	
		2.5間×10間	25坪	約336枚	
M-15H型ハウス	曲パイプ寸法／19.1×1.2×4.2 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	2.5間×5間	12.5坪	約156枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 4尺×6尺 ●組み立て部品一式
		2.5間×6間	15坪	約192枚	
		2.5間×8間	20坪	約264枚	
		2.5間×10間	25坪	約336枚	
		2.5間×12間	30坪	約408枚	
M-18型ハウス	曲パイプ寸法／22.2×1.2×4.8 2本＝1組 直管寸法　／19.1×1.0×5.47 スエッジ加工 	3間×6間	18坪	約224枚	●パイプ一式 ●ビニール(0.1mm) 天井用ビニール サイド用ビニール ●完成扉 4尺×6尺 ●組み立て部品一式
		3間×8間	24坪	約308枚	
		3間×10間	30坪	約392枚	
		3間×12間	36坪	約476枚	
		3間×15間	45坪	約602枚	

お見積り、工事についてもお気軽にお問い合わせください!

家庭用ミニ温室



エフクリーン仕様例









水稲用育苗箱



太陽シート



アルミ層が太陽光を反射し、シート内の温度上昇を抑えるため、ハウス内が高温になっても、ハウス換気が不要なベタ掛けシートです。

紙管巻き	折り包装
1350㎜ ×（50M）	2400㎜ ×（50M）
1600㎜ ×（30M）	2700㎜ ×（50M）
1700㎜ ×（50M）	3000㎜ ×（50M）
2000㎜ ×（30M）（50M）	3340㎜ ×（50M）

ミラシート

水稲育苗の保温、緑化、硬化用その他各種ハウス作物の育苗用に幅広くご利用いただけます。






規　格

0.3mm×210㎝×25m　0.3mm×230m×50m

0.3mm×210㎝×50m　0.3mm×270㎝×50m

0.3mm×230㎝×25m

クリンクリーナー



タンク容量：59ℓ　作業能率：70～120枚/h　ブラシ本数：6本

規格（巾×奥行×高）／470×285×550mm　重量／7kg

ダイライト



商品名
塩水選かご（36ℓ）
ダイライト T-300F
ダイライト RL-300ℓ
ダイライト フタT-300用

ハウス補修テープ



育苗用保温ネット



KAKUICHI A-SITE　日本の農業を応援したい！

農業用倉庫・ガレージの展示場
KAKUICHIA-Site茂原のご案内



◆ 常設展示棟 ◆

広スペースハウス

KSW-2031　HKS-3035
HHK-4040　HKS-4040
HHD3051

キャノポート

RG-6256　RG4L-9256
BG4L-9360


BG4L-9360（新商品）


HHK4040




HHD3051（新商品）



KAKUICHI A-SITE茂原

〒297-0015
茂原市東部台3-28-6
TEL:0475-44-5710
FAX:0475-44-5712
E-mall:sr_mobara@kaku-ichi.co.jp



事前予約は不要です。お気軽にお立ち寄り下さい！

組合員の皆様へ

はじめるオール電化

Aquro

「エコキュート」の名称は電力会社・給湯器メーカーが自然冷媒ヒートポンプ給湯器を総称する愛称です。

CHOFU 給湯器専門メーカーならではの

エコライフ エコキュート

給湯器、買い換えるならエコキュート!!

特長1 家計におトク!

給湯にかかるランニングコストは、月平均 約1/4。

［ランニングコストの比較］



【ランニングコストの算定条件（長府製作所調べ）】下記の条件にてランニングコストの目安を試算しています。
- 都市ガス給湯器と家庭用自然冷媒（CO₂）ヒートポンプ給湯機：EHP-3703AZ
- 【運転モード：「おまかせ（省エネ）」】を比較
- 給湯負荷：JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。
- 電気料金：中間電力 電化Styleコース 夜間料金 14.60円（税込） 昼間料金 30.06円（税込）（燃料調整額、基本料金除く）。※2019年8月 長府製作所調べ
- ガス料金：192.14円/㎥（広島ガス基準単位料金）、都市ガス給湯器の熱効率80%、基本料金除く。※2019年8月 長府製作所調べ
- 外気温・給水温度：広島地区（6地域）
- お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。
- ※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

特長2 ecoとく

※フルオートタイプ

浴そうの残り湯の熱の 約40%※1 を回収


※1【比較条件】EHP-3703AZ、JIS冬期給湯保温モード効率試験、23時にecoとく運転を開始した場合、ecoとく開始時ふろ熱量：21.8MJ、回収熱量9.0MJ

※条件によっては、運転を受付けないことがあります。

いざという時でも安心の設計！

耐震強度アップ

貯湯ユニットは震度7相当※1及び耐震クラスS対応※2の地震に耐える安心設計



■固定脚4本脚含（スリム・角型）
写真は角型タイプ

※1 高さ0.8秒、加速度7m/s²にて水平方向に加振。
※2「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」の耐震クラスSの基準を満足することによる（地震及び雨において）。

停電時でもお湯が使える

災害等による停電時でも、貯湯ユニット内に残っているお湯を停電前の設定温度に近い温度でシャワーや蛇口から使用できます。

※状況により使用できない場合があります。

カンタン操作の非常用取水

断水によって蛇口からお湯（水）が出せなくなってしまった時、かんたんなバルブ操作で貯湯ユニットのお湯（水）を取り出せるようにしました。



CHOFUエコキュート

スリムタイプ フルオートタイプ ecoとく 370L 3~5人



一般地仕様 EHP-3703AZ

角型 フルオートタイプ ecoとく 460L 4~7人



一般地仕様 EHP-4603BZ

井戸水を使用しているお客様には 角型 フルオート 460L 4~7人



一般地仕様 EHP-4603BX-I

掲載機種の価格やその他のプランもお気軽にご相談ください。

Aquro 株式会社 アクロ技研

■千葉営業所 0476(80)6050
■茨城営業所 029(831)1231
■関東支社 042(650)0322
■群馬営業所 027(224)1761

※ご連絡頂いた個人情報は申込商品等の発送代金決済、アフターサービスに関すること、その他組合の提供するご案内に活用します。 ※本チラシの掲載価格は、JA 全農希望小売価格です。

シロアリ防除・湿気対策は アサンテにおまかせください!!

シロアリ被害は早期発見が大切です。 あなたのお家は大丈夫ですか？



シロアリは普段目に付かない場所に
いるため、発見が遅れてしまいます。
アサンテの調査員が写真の制服、車両で
JA 長生管内を巡回訪問いたします。
床下調査をご希望の方はお気軽に
お申込ください。被害を未然に防ぐためにも、
まずは床下調査でご確認を！


シロアリ・湿気対策



地震対策



リフォーム



害虫・害獣駆除





調査・お見積り無料！ ※施工は有料です。

地震対策、リフォーム、害虫・害獣駆除のご相談も承ります。

〈診断・契約・施工〉 ASANTE 株式会社 アサンテ
東証一部上場

アサンテ窓口 フリーダイヤル 0120-557-419 <受付時間>
午前8：30～午後7：30（土日祝日も受付）

おウチ時間で、おかずからデザートまで♪

エーコープマーク品 レシピ

エーコープマーク品 とは、

国産へのこだわりと安全・安心の品質。
JAグループのプライベートブランドです。

① 安心の国産原料
② 『安全・安心』にこだわり
③ 地球環境にも配慮！

ぜひ、お試しください！！

ネギ

エーコープ こめ油・ほめられ酢・純正ごま油を使った

◆ネギたっぷり鶏チャーシュー

材料



★Aこめ油 小さじ2
★Aほめられ酢(下味用) 大さじ1
★ネギ 1/2本 ●鶏むね肉 1枚
〈タレ〉
★Aほめられ酢 大さじ2
★A純正ごま油 大さじ1/2
●醤油 大さじ1 ●おろしにんにく 1かけ
●一味唐辛子 少々

作り方

①フォークで鶏肉に穴をあけ、ほめられ酢に約30分漬けます。
②フライパンにこめ油を敷き、①の両面に焼き色をつけます。
③ジッパー付き耐熱袋に入れて口を閉じたら、沸騰したお湯に40～50分つけておきます(火が通るまで)。
④別のフライパンにネギを軽く炒めておき、③の袋から取り出した肉と〈タレ〉の材料を全て加えたら少し煮詰めて絡めます。
⑤食べやすい大きさに切り、器に盛りつけたら出来上がりです。

ネギ

エーコープ さば水煮・ぶどうのオイルを使った

◆ネギのアヒージョ

スペイン

材料



★Aさば水煮 1缶
★Aぶどうのオイル 適量
★ネギ 1/2本 ●にんにく 1かけ
●ミニトマト 5～6個
●黒コショウ 適量
●大葉 お好みで

作り方

①さば水煮は汁気を切り、ネギは一口大に切ります。にんにくは薄くスライスし、ミニトマトはヘタを取ります。
②フライパンの表面を薄く覆う程度のぶどうのオイル・にんにくスライス・ネギ・さばを入れます。
③中火で加熱し、ネギがしんなりしたら火を止めます。
④黒コショウをふり、お好みで刻んだ大葉をちらして出来上がりです。

トマト

エーコープ ぶどうのオイル・レモン果汁を使った

◆トマトのカプレーゼ

材料



★Aぶどうのオイル 大さじ2
★Aレモン果汁 小さじ1
★トマト 1個
●モッツァレラチーズ 1個
●フレッシュバジル 適量
●塩コショウ 適量
●あらびきブラックペッパー 適量



作り方

①トマトは半分に切り、太めの薄切りにします。
②モッツァレラチーズは水を切って半分に切り、トマトの枚数に合わせて薄切りにします。
③トマト、モッツァレラチーズ、バジルの順に並べて盛りつけます。
④ぶどうのオイルに塩コショウ・ブラックペッパー・レモン汁を入れてよく混ぜます。
③にかけたら出来上がりです。

いちご

エーコープ ミルクプリンの素を使った

◆いちごタルト

材料



★Aミルクプリンの素 1袋(32g)
★いちご 1パック ●生クリーム 50mℓ
●牛乳 200mℓ ●タルト(市販) 15cm型1個

作り方

①耐熱容器に牛乳を入れ、電子レンジ(500W)で約3分間加熱します。
②①にミルクプリンの素1袋を加え、泡立て器で約1分間かき混ぜよく溶かし、さらに生クリームを加えかき混ぜ合わせます。
③市販のタルトに粗熱を取った②を注ぎ、冷蔵庫で冷やし固めます。
④いちごを盛りつけたら出来上がりです。

ブルーベリー

エーコープ もちもちパンミックス・こめ油・飲む黒酢deブルーベリーを使った

◆ブルーベリーのマリトッツォ

材料



パン生地
★Aもちもちパンミックス 1袋 ★Aこめ油 大さじ2
●薄力粉 40g ●卵 1個 ●砂糖 大さじ1
●溶かしバター 20g ●水 100mℓ

クリーム
★A飲む黒酢deブルーベリー 大さじ1
★ブルーベリー(飾り付け用) 適量
●生クリーム 200mℓ ●砂糖 20g



作り方

①オーブンを180℃に予熱します。ボウルにこめ油、卵、水、砂糖、溶かしバターを入れ、混ぜます。もちもちパンミックスと薄力粉を加え、さらに混ぜます。
②まとまったら取り出して約5分間こね、6分割にして丸めます。
③天板にのせ、180℃のオーブンで約30分焼きます。
④生クリームは砂糖を加えてよく混ぜます。泡立ったら飲む黒酢deブルーベリーを加え、さらに混ぜます。
⑤パン生地に切り込みを入れて④のクリームをたっぷり入れたら、ブルーベリーを飾りつけて出来上がりです。

他にもインスタグラムにアップ中！！

Instagram(インスタグラム)にて、エーコープマーク品のその他のレシピも公開中!

次世代の農業に向けた取り組み～ドローンの活用～

■ 近づくスマート農業実装の未来

ビッグデータを活用したAI（人工知能）や5Gをはじめとする情報通信規格の拡充など、私たちを取り巻く環境においてテクノロジーの進化は目を見張るものがあります。農業界においても、それらとリンクした取り組みは様々な場面で実証試験を重ねており、近い将来、ICT（情報通信技術）を活用した農業は当たり前の光景になっているかもしれません。今回は、JA長生管内でスマート農業に取り組んでいる組合員に、実例や将来性についてお話を伺いました。

■ ドローン導入を決意したきっかけ

Q.水稲栽培で全面的にドローンを活用されていますが導入のきっかけは何だったんですか?

カメムシ防除に使おうと思ったのがきっかけです。斑点米率の高さが問題になった2019年に、私の圃場でも多くの被害を受けました。私は多くの水田を作付けをしているのですが、田植えの時期が早いところと遅いところとでは約1ヶ月の差が出てくる。そうなると当然ながら生育のスピードも異なります。そうした環境下では、全圃場に適期での防除が出来たとは言い難く、十分な効果が得られませんでした。そんな折、ドローンを用いて適期に薬剤散布を行うことでまったく斑点米が出なかったという話を聞きました。以前よりスマート農業に関心はあったのですが、近隣の良い事例も導入を決意する決め手となりました。



▲今後のスマート農業の展望について、熱く語ってくださった室川典弘氏

Q.実際にどの場面で使用していますか?

きっかけとなったカメムシ防除の薬剤散布はもちろん、田植え直後と中期での除草剤散布も行っています。今年からは穂肥をドローンで施肥することも始めました。

Q.ドローンを使用して良かった点は何ですか?

防除や施肥をデータとして記録できる点です。今までは動力散布機を用いて目分量且つ感覚で散布していましたが、ドローンでは「何回転でどれくらいの幅を散布したか」が数値化されるので、重複散布する事が自ずと少なくなり効率的だと感じました。

Q.逆に今後の改善点を挙げるとしたらどこですか?

バッテリーの持続性でしょうか。私は8個バッテリーを所有していますが、概ね1つのバッテリーで3～4分の時間しか取れません。
なので、持続性が改善されれば作業効率ももう少しアップすると思います。

■ドローンに最適な水稲除草剤

Q.除草剤は「プライオリティ豆つぶ250」を使用して頂いております。感想をお聞かせください。


プライオリティは雑草に対する効果が白化して目でわかるのでそこが気に入っています。性能面では、界面活性剤の力で処理したところのさざ波が消えて、散布したところがわかるのが良いですね。実際に処理した箇所が視認できるので安心します。また、豆つぶ剤は使用前に拡散性が高いと教えて頂きました。確かに軽量で一度にたくさん搭載できるので、広い圃場を処理するのに適していますね。

ドローンLOVES豆つぶ YouTube









▲豆つぶ散布時の動画はこちらです。

高い拡散性を有していることからドローン散布に最適な豆つぶ剤。2021年も処理時に立ち合いを行った。右端の写真は散布してから20日後で白化症状を見せたコウキヤガラ。

■最後に

誌面の都合上インタビュー内容をすべて記載できませんでしたが、来春はドローン以外の実演も予定しているとの事でした。今後を見据えた取り組みから目が離せません。

ドローンで使用できる農薬

ドローンマークが目印です!
今年のガイドブック内では、JA長生がドローン使用時におすすめする商品を、マークをつけてご案内しております。商品のご検討の際にご活用ください。

水稲除草剤



●プライオリティ 豆つぶ250

初中期一発除草剤。
ノビエのほか、ホタルイ、オモダカ、コウキヤガラ、イボクサ、キシュウスズメノヒエを抑える成分配合。



●ツイゲキ 豆つぶ250

中後期除草剤の豆つぶ剤。
ノビエのほか、ホタルイ、オモダカ、クログワイをしっかり防除。

本田防除剤



●ビームエイト スタークルゾル

カメムシ防除といもち病予防が同時で可能な本田防除剤。
無人航空機で使用する場合は8倍希釈で使用する。

企画・構成／高橋和照（クミアイ化学工業㈱）

協力機関一覧

（指導機関）

長生農業事務所

（肥料メーカー）

サンアグロ株式会社
朝日アグリア株式会社
片倉コープアグリ株式会社
セントラル化成株式会社
開発肥料株式会社
日本肥糧株式会社
吉澤石灰工業株式会社
ジェイカムアグリ株式会社
小野田化学工業株式会社
富士見工業株式会社
村樫石灰工業株式会社
産業振興株式会社
新ケミカル商事株式会社
ナイカイ商事株式会社
鈴木産業株式会社

（農薬メーカー）

クミアイ化学工業株式会社
北興化学工業株式会社
協友アグリ株式会社
日本農薬株式会社
日産化学株式会社
OATアグリオ株式会社
三井化学アグロ株式会社
シンジェンタジャパン株式会社
バイエルクロップサイエンス株式会社
アグロカネショウ株式会社
BASFジャパン株式会社
石原バイオサイエンス株式会社
住友化学株式会社

（資材メーカー）

平林物産株式会社
株式会社カクイチ

（生活資材メーカー）

株式会社アクロ技研
株式会社アサンテ

（編集）

JA長生　　JA全農ちば

農産物直売所 ながいき市場





毎月お得な特売日!

- ○毎週月曜…お米の日
- ○毎週火曜…トマトの日
- ○毎週水曜…ポイント2倍DAY
- ○毎週木曜…肉の日
- ○毎週金曜…たまごの日



ながいき市場　住所:茂原市六ツ野3981-1　TEL:44-6800

長生農業協同組合

南部営農購買センター　☎42-4343　FAX42-4342
【担当地区／一宮・睦沢・長生】

北部営農購買センター　☎33-7007　FAX33-6017
【担当地区／白子・本納・東郷】

西部営農購買センター　☎35-3001　FAX35-2007
【担当地区／長柄・長南・茂原】

◆営農購買センター

月	火	水	木	金	土	日	祝
○		○	○	○		○	

◆支所購買窓口（睦沢、高根、本納、東郷、長南、茂原）

月	火	水	木	金	土	日	祝
○		○	○	○			

※営業時間は8:30～17:00までとなります。
※農繁期（春・秋）の対応については従来通り、センター・支所での対応を行います。
　また、青果物の荷受、出荷業務は従来通りの対応と致します。