

令和9年度

購買ガイドブック



ご予約は令和8年10月13日までをお願いします。



令和8年9月
長生農業協同組合

令和9年度肥料・農薬予約注文、 購買ガイドブックについて

組合員の皆様におかれましては、日頃よりJA各事業につき、格別なるご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

政府は、「令和の米騒動」となった価格高騰を機に、「コメ生産量に不足があったことを真摯に受け止め、今後の需給逼迫に柔軟かつ総合的に対応する」と強調し、増産への転換を首相が明言しました。今後の動向についても注視し、引き続きコストの削減と有利販売に努めてまいります。

激変する世界情勢の中、農業を取り巻く環境は厳しい状況が続いており、農業資材価格の高止まり、肥料・農薬・燃料価格の上昇、さらには近年の気候変動により、作物の生育や収穫に深刻な影響を及ぼし、農家の経済的安定を脅かす要因となっております。

このような中、協同組合としての強みを発揮すべく、肥料の安定供給に向け、予約購買制度に基づいた取り組みを行います。つきましては、このガイドブックをご参照の上、折込の注文書にてお申込みいただきますようお願いいたします。

注文書につきましては、JA担当職員がお伺いいたしますが、JA長生各支所窓口でもお受けいたします。

令和9年についても、肥料大口予約奨励(2ページ参照)を実施いたします。また、下部のとおり代金支払い月により優遇措置に取り組みます。

予約価格の優遇措置と、大口奨励制度(キャッシュバック)については、一括大量仕入れによるスケールメリットを活かした仕入額の交渉によるものですので、予約購買制度へのご理解とご利用をお願いいたします。

また、集約銘柄肥料の導入、土壌診断による施肥設計、環境配慮型肥料(プラスチックを含む原料を使用していない)、農薬の大型規格による生産コスト削減に向けた取り組みを実施しておりますので是非、ご利用くださいますようお願いいたします。

春肥料予約購買価格について

JA長生では予約購買により、安定供給と価格の低減を目指し取り組んでいます。下記のとおり、お支払時期により購入価格がお得になりますので是非、ご利用ください。

注文書の価格は優遇後の価格です。

1月払い	当用購入価格に対し	5%優遇
6月払い	当用購入価格に対し	3%優遇
9月払い	当用購入価格に対し	0.5%優遇

目 次

令和9年度 肥料・農薬大口予約奨励金について	2
肥料 コスト低減・削減の取り組み	3
農薬 コスト低減の取り組み	4
種子消毒～育苗のポイント	5～6
水稻育苗用保温資材の紹介	7
エコホープDJの使用方法和注意点	8
用土消毒の方法について	9
ジャンボタニシ食害防止の対策	10
カメムシ（不稔粒、斑点米）防除の対策	11
水田藻類防除の対策	12
水稻 夏季高温対策のための施肥のススメ	13
肥料の紹介	14～23
土の健康診断してみませんか？ （土壌診断に基づく適正施肥）	24
バイオスティミュラント（BS）の紹介	25
農薬の紹介	26～35
JA長生農機センターからのお知らせ	36
自動車センター・セレモニーサービスセンターの紹介	37
生活資材の紹介	38～40
アグリマイティー資金のご案内	41
建物更生共済My家財プラスのご案内	42

令和9年度 春肥料予約注文書（黄色注文書）

令和9年度 水稻農薬予約注文書（青色注文書）

令和9年度 水稻低コスト大型規格農薬予約注文書（ピンク注文書）

各注文書はガイドブック内に入れ込んであります。

○肥料注文書 24ページ、25ページの間

○農薬注文書 36ページ、37ページの間

○水稻低コスト大型規格農薬注文書 巻末

注文書（提出用）のみ、切り離して提出してください。

春肥料 農薬 大口予約奨励金について (キャッシュバック)



★令和9年の予約購入金額は税抜き価格にて算出します。

肥料の奨励金について

- ① 供給対象期間: 令和9年1月までの予約注文で、4月末日までの配送・引取分まで。
- ② 対象外品目: ●堆肥(菜種油粕・脱脂ぬか・魚粕)
●系統外肥料(各営農購買センターにお問い合わせ下さい。)

●肥料の支出基準

予約購入金額が、税抜40万円以上で	➡	購入金額の 3%	助成
予約購入金額が、税抜150万円以上で	➡	購入金額の 5%	助成
予約購入金額が、税抜250万円以上で	➡	購入金額の 7%	助成
予約購入金額が、税抜500万円以上で	➡	購入金額の 8%	助成
予約購入金額が、税抜1,000万円以上で	➡	購入金額の 9%	助成

※支出時期は、令和9年10月に購買品取引口座に振込予定です。

水稻農薬の奨励金について

- ① 供給対象期間: 令和9年3月までの予約注文で、4月末日までの配送・引取分まで。
- ② 対象品目: 水稻農薬予約注文書にて記載されている大口奨励品目
◇注文書の大口奨励欄に○印がついている商品です。
▷メガ得規格(担い手直送)は、大口奨励対象外です。

●水稻農薬の支出基準

予約購入金額 税抜20万円以上

➡ 購入金額の **10%** 助成

JA長生 コスト低減・削減の取り組み ①肥料

担い手直送(春肥料)の取り組みについて

朗報!! 肥料でも直送ができるようになりました!!

輸送費や肥料原料の高騰を受け、資材の価格も年々値上がりしておりますが、メーカーの協力を得てコストパフォーマンスの高い価格でのご提供が可能となりました!

担い手直送(肥料)のメリット

- **まとめて発注することで、ご自宅・倉庫へ配送いたします! 配送料は、かかりません!**
注文の段階で、通常予約価格よりも値下げをし、組合員、利用者のご自宅・倉庫へメーカーから直送するため、配送料も掛かりません。
- **大口奨励金対象商品です!**
大口奨励金の対象となります。

担い手直送【肥料】の対象となる条件

- ① **12トン以上の発注数量。**
 - 15kg袋だと800袋以上の発注が必要です。合計重量が12トンになれば、直送出来ます!!
 - ② **原則12トン車が出入りでき、フォークリフトをお持ちの方。**
 - 納品は一か所で、12トン大型トラックの出入りができる場所に限ります。
また、フォークリフトをお借りしての納品となります。
※パレット返却のご協力をお願いします。
 - ③ **キャンセル・返品は、お受けできません。**
 - 事前予約直送の為、トラック手配等決まってしまうので、キャンセル・返品はお受けできません。
ご承知くださいますようお願いいたします。
- ※肥料の種類については、限定になりますので詳しくは、営農購買センターへお問い合わせください。

肥料では、銘柄の集約・共同購入によってコスト削減に取り組んでいます!!

低コスト肥料ラインナップ

			
化成 16-16-16	化成 14-14-14	化成 8-8-8	化成 14-18-14
一般作物向け			水稻元肥向け

JA長生 コスト低減の取り組み ②農薬

担い手直送(メガ得規格 4ha分)の取り組みについて

水稻農薬の『メガ得規格(4 ha分)』ですが、様々なご要望にお応えして豊富なラインナップをご用意いたしました。購買ガイドブックの巻末に注文書がございますので、是非ともご覧ください。また、『メガ得規格(4ha分)』以外にも、『10kg粒剤・2Lフロアブル等』がございますので、併せてご覧ください。

担い手直送(水稻農薬)のメリット

●メーカー直送または購買センターから配達いたします!

ご注文時に配送予定日をお選び頂ければ、その時期に配達いたします。

【土日・祝日、GWの期間は配達を行っておりません。また、時間指定等も出来ませんのでご了承ください。】

※注文締切日※

■第1回注文受付日 令和8年12月1日～令和9年1月12日まで。 配送日 令和9年3月1日より随時配送予定。

■第2回注文受付日 令和9年1月20日～令和9年2月24日まで。 配送日 令和9年4月13日より随時配送予定。

●メガ得規格(4ha分)はkg換算でコストメリット抜群!

『メガ得規格(4ha分)』は大口奨励金の対象外ですが、kg換算するとぐ～んとお得感を感じることが出来ますよ!



メガ得規格(4ha分)をご注文の方へお願い!

メーカー完全受注生産の為、返品は出来ませんのでご了承ください!

担い手直送【農薬】取り扱い商品



ブーンパティート



セイテン



バッデンLX



サラブレッドGO

ラオウ



他にも取扱商品がありますので、営農購買センターへお問い合わせください!

種子消毒～育苗のポイント

病害発生予防のために、播種後の温度管理・水管理には十分注意する。
緑化期以降は徒長苗防止のためハウスの換気に努める。

1.<種子消毒>の方法について

※種子は消毒してありませんので、
各自で必ず種籾消毒を行いましょう。

(1) 目的:種子伝染性(バカ苗病・細菌病・いもち病)病害の、発生を防ぐために行います。



バカ苗病



もみ枯細菌病



褐条病

(2) 種子消毒剤使用上の注意点

- ① 防除効果の高い薬剤の選定。
(スターナ含有剤は「もみ枯細菌病」「褐条病」に対する薬剤耐性が確認されたので使用を控える。)
- ② 消毒するときの水温は、約10℃が目安。
- ③ 消毒時の種籾と薬液の容量比は1:1以上。
- ④ 浸漬時間と希釈濃度は必ず守る。
- ⑤ 24時間浸漬後の陰干しと、その後の浸種3日間が重要。
- ⑥ 種子消毒に使用した薬液は適切に処分する。


(3) 種子消毒剤及び使用方法

- ① 使用薬剤名
「テクリードCフロアブル」「ヘルシードTフロアブル」**200倍24時間浸漬**
浸漬する時、よく揺るのがポイントです。また消毒後は風乾し水洗いせずに、浸種します。
- ② 使用方法(下表参照)
水20リットルに対して、**テクリードCフロアブル**1本(100ml)または**ヘルシードTフロアブル**1本(100ml)を入れると、使用濃度の「200倍」です。

薬剤の使用量と種籾量の目安

希釈濃度	種籾量	4kg (1袋)	10～12kg (2.5～3袋)	20kg (5袋)	40kg (10袋)
200倍	薬 量	40ml	100ml(1本)	200ml(2本)	400ml(4本)
	水 量	8リットル	20リットル	40リットル	80リットル

種粉20kgの場合の使用方法(下図参照)



購入種子別種子消毒の手順



※テグリードCフロアブルを使用の場合は陰干ししなくても可。

※浸種始めの3日目までは「種子消毒中」なので、水を交換したり動かしたりしない。

※浸種4日目からは、毎日水交換を行っても良い。
(浸種水温の上昇を防ぐため)

※浸種は、発芽を揃えるため、積算水温で100℃程度を目安に、水温15℃の場合は約7日間(水温10℃の場合は10日間)浸種し、十分に吸水させます。早期の低温時は避けてください。

※催芽は、30℃を目安(30℃以上は細菌病の発生を助長するため)にし、出芽を揃えるため、幼芽長が1mm以内の「ハト胸状態」で催芽を終えるようにします。

育苗のポイント

昨今の異常気象により、浸種作業、水温管理等に注意が必要になるため、啓発チラシを作成し、種子配達時に配付いたしますので、よろしくお願いいたします。

水稻育苗用保温資材の紹介

①本州太陽シート 焼け苗を防止し出芽が揃うベタ掛けシート



主原料：特殊不織布・フィルム

特徴機能：透湿・多孔保温


規格：210cm×25/50m

230cm×25/50m

270cm×50m

※注意点：本シートは冷たいものを温めるのは苦手です。4月初旬播種する場合はシート被覆の数日前からハウスを密閉し、置床の地温をあらかじめ高めておいてください。

②ハイホワイトシルバー 高反射・遮熱性能で焼け苗を防止



主原料：ポリエチレン複合膜

特徴機能：遮熱・光反射

規格：230cm×25/50m

270cm×25/50m

300cm×50m

③ミラシート 優れた断熱・保温性&軽くて丈夫



主原料：発泡ポリエチレン

特徴機能：軽量・高保温

規格：200cm×50m

240cm×50m

270cm×50m

■ 育苗環境・目的別の推奨使い分け比較表

育苗環境・お悩み	推奨シート	選定のメリット・ポイント
被覆内の「ムレ・結露」による病気を抑えたい	本州太陽シート	透湿性により湿気を適度におさめ結露病害を低減
毎日のシート開閉・展張作業を軽く楽にしたい	ハイホワイトシルバー	超軽量素材のため高齢者や少人数作業でも扱いが容易
ハウス育苗で日中の「高温・焼け苗」を防ぎたい	ハイホワイトシルバー	高反射性能でハウス内の温度急上昇を予防し健苗へ
寒冷地や早植えてとにかく「保温性」を最優先したい	ミラシート	発泡層が夜間の放射冷却を抑え、根張りを促進

規格サイズ（幅・長さ）のご相談、サンプル・お見積りは気軽にお申し付けください！

平林物産株式会社

農業資材・パイプハウス総合取扱店

お問い合わせはJA長生 各営農購買センターへ

エコホープDJの使用方法和注意点


※エコホープDJは千葉エコ対象の商品です

- (1) エコホープDJとは⇒減農薬栽培(千葉エコ)において成分カウントされません。
微生物農薬の種子消毒剤です。
化学農薬と性質が異なるため、剤の特性をよく理解することが必要です。

(2) エコホープDJ使用時のポイント

- ①【重要!】水管理、温度管理を適正に行ってください。
- ②種子消毒後の風乾作業は必要ありません。
(過度の風乾は効果減少のおそれあり)
- ③種もみ浸種水温は10℃以上とし、催芽もハト胸状態まで行くと効果的。
低水温での浸種は催芽不十分となりやすく、出芽不良がおきやすくなります。
- ④催芽、出芽は30℃が成功の秘訣。催芽・出芽を十分行い苗を揃える。
特に無加温出芽の場合は保温につとめて下さい。

エコホープDJの上手な使い方



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリコデルマ アトロピリデを含む農薬の総使用回数
稲	ばか苗病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病	200倍	浸種前～催芽前	—	24～48時間種子浸漬	—
		200倍	催芽時		24時間種子浸漬	
	いもち病、苗立枯病(リゾプス菌)	200倍	浸種前～催芽時			

※規格:100g(一年で使い切して下さい。)

※保存方法:常温保存(4~27℃)

エコホープDJは生き物です! 効果を十分に発揮させるには…
適正な温度管理・かん水管理が必要です!
教科書どおりの温度管理・育苗管理の実施をお願いします

<用土消毒>の方法について

(1) 目的:育苗箱に発生する苗立枯病(カビ)や、細菌病の発生を予防するために行います。

(2) 用土消毒剤使用上の注意点

- ① 薬剤と育苗培土との混和は、播種7日前～播種直前に行う。
- ② 薬剤の使用量をきちんと守る。
- ③ 混和は均一に行う。
- ④ 播種前の床土への灌水はたっぷりと行う。
- ⑤ 播種直後の覆土への灌水はしない。

(3) 使用薬剤及び使用方法

- ・苗立枯病(リゾープス菌)、細菌病予防に、20リットル(培土約1袋)に対して「フタバロンA粉剤」を100g混和し、覆土に使用する。
- ・床土への灌水と、播種後の覆土が少ないと「根上がり」をしやすくなるので、注意する。


※細菌性病害は、発生すると治す薬剤がありません。「フタバロンA粒剤」はカスガマイシン剤を含有、「もみ枯細菌病」にも優れた効果を発揮します。また、薬剤防除のほか、育苗期は高温にならないように温度管理にも注意しましょう。

床土・覆土の消毒(使用にあたっては必ずマスク着用)

培土の消毒

苗立枯病(リゾープス菌)、細菌病予防に

(育苗箱1箱5L(20Lで4箱))



床土(4L)

- 覆土(1L)にフタバロンA粉剤5g/箱を混和する。
(※20Lの培土にフタバロンA粉剤100g)を混和し、覆土に使用する。)



苗立枯病(リゾープス、フザリウム、ピシウム)の予防に、ナエファインフロアブル1,000倍液を箱あたり500ml 播種時～緑化期(2回以内)に灌注する。

(4) カビによる苗立枯病の対策薬剤

	リゾープス菌	フザリウム菌	トリコデルマ菌	ピシウム菌
	30～40℃の高温多湿の場合で発生しやすく、培土上方にカビが発生する。 灰色カビ～白カビ	播種後低温(10℃以下)にあたり、土壌の乾湿を繰り返すと発生。 ピンクカビ～白カビ	高温多湿条件下で発生しやすいが緑化開始時の低温が発生を助長する。粉や床土にカビが発生。 青緑カビ～白カビ	出芽時・育苗中に低温・過湿条件下で発生しやすい。地際部や根が褐変・腐敗し、綿状のカビが発生。 ムレ苗症状
ダコニールアルファ	○			
ダコレート水和剤	○	○	○	
ナエファインフロアブル	○	○		○
タチガレエースM液剤		○		○

フジワン粒剤の育苗箱施用(発根促進)

フジワン粒剤の処理方法

- 処理時期:苗緑化始期(発芽後2～4日)
- 薬 量:25～50g/箱(フジワン粒剤3kgで約100箱)
- 方 法:均一散布後灌水し、薬剤をくずれさせる。



ジャンボタニシ食害防止の対策

～ 防除に努めましょう ～

稲刈り後(秋)防除の場合…湛水が必要!

石灰窒素によるジャンボタニシ防除と秋鋤き

石灰窒素の主成分“カルシウムシアナミド”は、水中でカルシウムとシアナミドに分解し、このシアナミドが殺貝効果を発揮します!

水温が15℃以上の時期に、
3～4cm湛水し、
1～4日放置してください。




ジャンボタニシが活動を
始めて水中に出てきます。

石灰窒素 20～30kg/10aを
全面にむらなく散布して、
3～4日放置してください。



水中に溶けたシアナミドの効果で
ジャンボタニシは死にます。

自然減水を
待ってください。



石灰窒素を含んだ水が、水路に
流れ出さないように注意ください。

田面が乾いたのち、5～10cm程度の浅鋤きをすると、石灰窒素の効果で稲わらの腐熟が促進されます!

資料提供:片倉コープアグリ株式会社

ジャンボタニシの対策について(冬期の対策)

冬期の耕うん

冬期の耕うんは、貝の粉碎と貝を地表に掘り出し、寒さに晒す効果があります。
なるべく、土壌が乾燥して固く、かつ気温が低い12月～1月頃に行ってください。
耕うんのポイント:作業速度を通常より2～4割遅くし、回転数を早くすること。

農薬のコツ!

① 散布は「貝が動いているのを確認してから!」

「スクミノン」「ジャンボたにくん」などの殺貝剤は、貝が食べないと効果がありません。貝は寒いと農薬を食べず、水温15℃以下では効果が著しく低下します。貝が触角を出して、活発に動いている姿を確認してから使いましょう!

② 農薬散布後3～4日間、水は深く!

ジャンボタニシは、水の中でしか農薬を食べることができません。散布後は水深を3～5cmに保ち、貝に農薬をしっかりと食べさせましょう!また、農薬がくずれると食べられなくなります。水の出入りを少なくし、3～4日間は、田面を静かに保ちます。

③ 殺貝剤と食害防止剤の併用はダメ!

ジャンボタニシに登録のある農薬には、貝を殺す殺貝剤と、貝をマヒさせるだけの食害防止剤があります。

「パダン粒剤4」などの食害防止剤を使用すると、貝がマヒして動けなくなり、稲も食べませんが、「スクミノン」などの殺貝剤も食べなくなります。「パダン粒剤4」の効果は1週間程度なので、苗箱施用などしている場合は、殺貝剤の散布を遅らせるなど、併用しないよう注意しましょう!

ジャンボタニシの対策について(移植時～)

●主なジャンボタニシ防除剤の特徴と使用方法

商品名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	効果	水管理	使用上のポイント
パダン粒剤4	収穫30日前まで	4kg	6回以内	食害防止	浅水	主に食害防止効果。 ごく浅くして水中の農薬濃度を高めると効果的です。田植同時散布が効果的です。
スクミノン	収穫60日前まで	1～4kg (4kg推奨)	2回以内	殺貝	湛水散布	中貝～大貝にも高い殺貝効果。 全面均一散布が基本。(スポット処理不可) 低温時には効果減少のおそれ有。
ジャンボたにくん	収穫60日前まで	1～2kg	2回以内	殺貝	湛水散布	湛水管理をして、水田全体に均一散布してください。動力散布機でも散布できます。

長生地域水田ではジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の発生が拡大しており、水稻では越冬貝により、田植直後の苗が食害されているなどの被害が発生しています。

ジャンボタニシの根絶は困難です。しかし、**薬剤による防除・耕種的な対策を組み合わせることによって被害を軽減することができます。**

なお、農薬の使用にあたっては、登録のある薬剤で安全使用基準を厳守してください。

椿油かすには強い魚毒性があり、流出した場合、魚介類に影響を及ぼします。農薬取締法において、害虫駆除・防除を目的として使用することは処罰の対象となります。

カメムシ(不稔粒、斑点米)防除の対策

近年増加傾向の斑点米カメムシの一種「イネカメムシ」は出穂期頃に飛来し加害されるとその穂は不稔となり、斑点米による品質低下だけでなく**収量低下に直結**します。出穂直前～出穂始めに水田に侵入するため、**早期防除**を徹底することが防除のポイントです。「**出穂始め**」と「**乳熟期**」の2回防除を実施することで不稔粒、斑点米を抑えましょう。



イネカメムシ



クモヘリカメムシ




ホソハリカメムシ



アカスジカスミカメ



出穂期 (40～50%が出穂)	穂揃期 (80～90%が出穂)	乳熟期 (出穂15日後)
--------------------	--------------------	-----------------



カメムシの対策について(農薬紹介と防除方法)

商品名	10a当りの使用量	使用時期(収穫前日数)	使用回数	使用上のポイント
スターフル豆つぶ	250g	7日前まで	3回以内	出穂期～穂揃期に湛水状態で散布。 ※散布後7日間は落水やかけ流しはしないで下さい。
スターフル粒剤	3kg			
キラップ粒剤	3kg	14日前まで	2回以内	出穂10日前～出穂期に湛水状態で散布。 ※散布後7日間は落水やかけ流しはしないで下さい。
トレボン粉剤DL	3kg～4kg	7日前まで	3回以内	カメムシがいた場合、 直接付着させること。
トレボン乳剤	希釈倍率2000倍	14日前まで	3回以内	

防除方法

①斑点米対策でスターフル豆つぶ・粒剤を使用する場合は出穂5～7日後頃、キラップ粒剤を使用する場合**10日前～出穂期**に防除をおこなう。

イネカメムシ、クモヘリカメムシ等の大型カメムシの場合は直接付着させる粉剤・液剤での防除が望ましい。

②穂揃期後も発生が多い場合は、出穂後15日頃に追加防除をおこなう。

③畦畔や周辺の休耕地の除草は、出穂14日前頃におこなう。




長生管内でも水稻航空防除が実施されていますが、航空防除後もカメムシ類の発生状況を確認し、飛来成虫また乳熟期以降の幼虫が多い場合は、追加で防除の実施をおこなってください。

資料提供: 千葉県農林総合研究センター・バイエルクロップサイエンス株式会社


水田藻類防除の対策

～ 藻類対策は“出さない”ことが重要です ～

水田に発生する藻類の例



藻類被害の例



藻類被害による影響

- 日光の遮断による水温・地温の低下→稲の生育遅延
- 稲のなぎ倒し、浮き苗の発生
- 除草剤の散布の妨げ（拡散不良）
- 肥料分が奪われる

藻類に対し抑制効果のあるジメタメトリンや、シメトリン配合の除草剤体系が有効です。

また初期除草剤「先陣」を処理する事で、ジャンボ剤、豆つぶ剤がよりよく拡散し安定した効果を発揮しやすくなります。

例



*代掻き～田植までの期間が長い場合は田植えまでに藻類が発生してしまうことがありますので、その場合は代掻き後に先陣ジャンボを散布して藻類発生を予防してください。

資料提供：クミアイ化学工業株式会社

######

水稲育苗用培土

① 合成培土3号

20kg入・500kg入・1t入



N	P	K
0.04	0.08	0.05

1箱当り 2.7～3.0kg

商品特長

長年使い続けられている培土
健苗育成に最適
粒径が揃った高品質培土

サンアグロ

② 豊作培土

20kg入・500kg入



N	P	K
0.04	0.16	0.05

1箱当り 2.4～2.7kg

商品特長

容量重視(約24ℓ)
粒径を大きめに揃えた培土

サンアグロ

③ 平成培土

20kg入・500kg入・1t入



N	P	K
0.04	0.08	0.05

1箱当り 3.0～3.5kg

商品特長

低価格培土
合成培土3号に比べ粒径が細かい

サンアグロ

詳しい育苗の
ポイントはP5～P7、
P9をご覧ください。



水稲用肥料【元肥 15kg袋】

④ コシヒカリ化成15

15kg入



N	P	K
10	26	16

10a当り 1.5～2袋 比重:約1.0

商品特長

コシヒカリの元肥
15kg軽量タイプ
別途追肥が必要

サンアグロ

⑤ ちばの水稲元肥15

15kg入



N	P	K
16	18	13

10a当り ふさおとめ:1袋～2袋 ふさこがね:
1袋半～2袋半 粒すけ:1袋～3袋 比重:約1.0

商品特長

千葉県で育種した「ふさおとめ・ふさこがね・粒すけ」向けの元肥専用肥料です。
元肥一発肥料ではありませんので、生育状況に応じて追肥の施用をご検討ください。

サンアグロ

水稲用肥料【元肥一発 15kg袋】

⑥ コシヒカリ一発15改

15kg入



N	P	K	苦土
20	12	12	2

10a当り 1.5～2.5袋 **比重:約0.8**

商品特長

コシヒカリの元肥一発肥料。
15kg軽量タイプ。
速効性窒素が約5割
緩効性窒素が約5割

サンアグロ

注意点

肥料の比重に関しては天候・湿度などの
環境による影響を強く受けるため、
目安として認識をお願いいたします。

コシヒカリ・粒すけ専用

⑦ ツーコート一発コシヒカリ15 15kg入



N	P	K	苦土
20	11	12	1.5

10a当り 2~3袋 比重:約0.8

商品特長

コシヒカリの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ
カリ成分も生育後半まで持続
白未熟米対策の一助に!

サンアグロ

⑧ スーパーてまいらずコシヒカリ 15kg入



N	P	K	苦土
20	13	12	3

10a当り 1.5~3袋 比重:約0.8

商品特長

速効性窒素が約5割、緩効性窒素が約5割で追肥のいらない省力が可能なコシヒカリ用一発肥料

片倉コープアグリ

⑨ 粒すけ一発ライト2588 15kg入



N	P	K
25	8	8

10a当り 2~3袋 比重:約0.8

商品特長

粒すけ専用元肥一発肥料
栄養成長期間中の葉色を濃くするため
リニア型80日タイプの緩効性肥料を配合。
緩効性窒素は約5割配合

セントラル化成

⑩ ツーコート一発粒すけ15 15kg入



N	P	K
22	8	10

10a当り 2~3袋 比重:約0.8

商品特長

粒すけの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ
チッソだけでなくカリ成分も生育後半まで持続。粒すけの特長である粒張りの充実と白未熟米対策の一助に!

サンアグロ

早生品種専用

⑪ ふさがね一発15 15kg入



N	P	K
22	14	14

10a当り 2~3袋 比重:約0.8

商品特長

ふさがねの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

サンアグロ

⑫ ふさおとめ一発15 15kg入



N	P	K
20	15	15

10a当り 2~3袋 比重:約0.8

商品特長

ふさおとめの元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

サンアグロ

⑬ 早生用一発15 15kg入



N	P	K
26	10	10

10a当り 1.5~2.5袋 比重:約0.8

商品特長

コシヒカリ以外の元肥一発肥料
15kg軽量タイプ
チッソ成分が高くコスト低減
微生物分解型の緩効性肥料含む

サンアグロ

⑭ スーパーてまいらず早生用 15kg入



N	P	K
27	10	8

10a当り 1~3袋 比重:約0.8

商品特長

速効性窒素が約5割、緩効性窒素が約5割で追肥のいらない省力が可能な早生用一発肥料

片倉コープアグリ

水稲用肥料【元肥一発 20kg袋】

コシヒカリ専用

⑮ 楽っ子コシヒカリ改

20kg入



N	P	K	苦土
15	12	12	2

10a当り 1.5~2.5袋 比重:約0.9

商品特長

コシヒカリの元肥一発肥料。
速効性窒素が5割。
緩効性窒素が5割。

サンアグロ

⑯ てまいらず464

20kg入



N	P	K	苦土
14	16	14	3

10a当り 1.5~3袋 比重:約0.9

商品特長

速効性窒素が約5割、緩効性窒素が約5割で追肥のいらない省力が可能なコシヒカリ用一発肥料

片倉コープアグリ

⑰ 究極の一発ズバっと240J

20kg入



N	P	K	苦土
12	14	10	2

10a当り 2~3袋 比重:約1.0

商品特長

コシヒカリ専用元肥一発肥料
被膜崩壊性、浮上性を改善した環境配慮型被覆肥料Jコートを使用。
けい酸加里17%配合し、乳白米を軽減。

ジュカムアグリ

⑱ みどり戦堆コシー発500

20kg入



N	P	K
15	10	10

10a当り 1.5~2.5袋 比重:約0.8

商品特長

豚ふん堆肥約35%配合。連用により圃場の地力向上が期待できます。従来品より被覆樹脂率の低いコーティングを使用しているため、河川などへの流亡が軽減されます。粒状に加工しているので側条施肥にも対応しています。

朝日アグリ

早生品種専用・環境配慮型肥料・有機肥料

⑲ 楽っ子ふさおとめ

20kg入



N	P	K	苦土
15	15	15	2

10a当り 2~2.5袋 比重:約0.9

商品特長

長年使い続けられている
ふさおとめの元肥一発肥料

サンアグロ

⑳ ふさこがね専用一発033

20kg入



N	P	K
20	13	13

10a当り 1.5~2.5袋 比重:約0.8

商品特長

ふさこがね用元肥一発
速効性窒素が約6割、緩効性窒素が約4割で追肥のいらない省力型のふさこがね専用一発肥料

セントラル化成

㉑ マイルドキープN500Dd

20kg入



N	P	K	Mg
15	10	10	3

10a当り 早生品種:1.5~4袋
コシヒカリ:1.5~3袋 比重:約0.9

商品特長

被覆肥料不使用で水稲一発栽培の可能性が高い環境配慮型肥料です。プラスチックを含む原料を使用していない為、環境への負荷軽減に役立ちます。

片倉コープアグリ

㉒ 有機アグレット673特号

20kg入



N	P	K	苦土
6	7	3	1

10a当り 2~4袋 比重:約0.7

商品特長

化学肥料を使用していない
コシヒカリ用元肥です。
ちばエコ米適用肥料

朝日アグリ

水稻用肥料【有機・飼料用米・ペースト・追肥肥料】

②③ 飼料用米専用一発15

15kg入



N	P	K
26	10	10

10a当り 2〜3袋 比重:約0.7

商品特長

飼料用米の元肥一発肥料
15kg軽量タイプ

サンアグリ

②④ ハイセラN27ロング

15kg入



N	P	K
27	9	7

10a当り 2〜3袋 比重:約0.8

商品特長

飼料用米・多収米専用元肥一発肥料
主に早生品種(アキヒカリ・夢あおば)に最適。緩効性窒素は5割配合(リニア型のみ)

セントラル化成

②⑤ ネオペースト1号

20kg入



N	P	K
12	12	12

10a当り 1〜2袋

商品特長

液状側条施肥専用肥料。
ネオペーストの高成分肥料。

片倉コープアグリ

②⑥ ネオペースト2号

20kg入



N	P	K
10	16	12

10a当り 1〜2袋

商品特長

液状側条施肥専用肥料。
ネオペーストの低成分肥料。

片倉コープアグリ

②⑦ ネオペーストSR502

20kg入



N	P	K
15	10	12

10a当り 1.5〜2.5袋

商品特長

液状側条施肥専用肥料。
緩効性窒素入りで2段施肥機との
組み合わせで元肥一発施肥が可能

片倉コープアグリ

②⑧ 軽量追肥15

15kg入



N	P	K
22	2	14

10a当り 0.5〜1袋

商品特長

コスト重視の水稲用追肥
15kg軽量タイプ

サンアグリ

②⑨ セントラル尿素

15kg入



N
44.5

10a当り 2.5〜5kg

商品特長

水稻・麦・飼料作物の追肥等、
ドローン・ラジヘリの空中散布に
使用可能。

セントラル化成

③⑩ コロンDスプレー

20kg入



N
20

10a当り 約2L

商品特長

- ・原液散布が可能な窒素液肥。
- ・高濃度散布でも肥料焼けにくい。
- ・積載量の少ないドローンでも広範囲の散布が可能。

片倉コープアグリ

園芸肥料【野菜向け】

③① 強力ホルム野菜化成

20kg入



N	P	K
14	18	14

10a当り 2〜3袋

商品特長

長年使い続けられている
野菜専用肥料
ゆっくりジワジワと効果を発揮

サンアグロ

③② ジシアン555

20kg入



N	P	K
15	15	15

10a当り 2〜4袋

商品特長

ジシアンの働きで窒素成分が
ゆっくり長効きする高度化成

片倉コープアグリ

③③ SCねぎ専用047

20kg入



N	P	K
10	14	7

10a当り 2〜4袋

商品特長

硫黄を好むネギ・ニンニク専用
チッソ成分の約8割はゆっくり
効果を発揮 (約140日)

サンアグロ

③④ ほう素入り野菜専用肥料Dd404

20kg入



N	P	K	ホウ素
14	10	14	0.3

10a当り 1〜2袋

商品特長

ホウ素が入った野菜専用追肥
すぐに効いて効果が持続

サンアグロ

③⑤ ちばやさい808

20kg入



N	P	K	苦土	ホウ素
8	10	8	2	0.2

10a当り 2〜5袋

商品特長

有機質約4割、苦土、ホウ素入り粒状品。
野菜用の低コスト化成肥料で、園芸
全般に使用できます。

片倉コープアグリ

③⑥ エコレット208

20kg入



N	P	K	マンガン	ホウ素
12	10	8	0.2	0.1

10a当り 5〜10袋

商品特長

豚ふん堆肥約40%、微量元素入りの
堆肥活用銘柄。
汎用性の高い園芸用肥料。

朝日アグロ

③⑦ SC36

20kg入



N	P	K
12	12	12

10a当り 2〜4袋

商品特長

硫黄で被覆した黄色い肥料
チッソ・リン酸・カリ全てゆっくり
効果を発揮 (約90日)

サンアグロ

③⑧ 燐硝安加里1号

20kg入



N	P	K
15	15	12

10a当り 1〜2袋 (20〜40kg)

商品特長

硝酸態窒素入り速効性肥料。
植物が好んで吸収する硝酸態
窒素が約4割含まれる。
ネギや果菜類の追肥に最適。

ジェイカムアグリ

園芸肥料【野菜向け】

③9 野菜美人

20kg入



N	P	K	ホウ素
10	10	10	0.2

商品特長

野菜専用肥料
ホウ素が入っているため、高温期に栽培するアブラナ科野菜に適した肥料

日本肥理

④0 ちばの恵みぎゅ〜っと885

20kg入



N	P	K
8	8	5

10a当り 5〜12袋

商品特長

千葉県の子ふん堆肥約40%配合。牛ふん堆肥と肥料を一緒に散布できる粒状肥料。

朝日アグリ

④1 落花生専用550

20kg入



N	P	K
5	15	20

10a当り 3〜5袋 (60〜100kg)

商品特長

落花生専用肥料。
豆類にも最適。

ジェイカムアグリ

④2 野菜の達人

1kgボトル・15kg入



N	P	K
15	14	10

10a当り 1〜2袋

特長

すぐ効く野菜専用追肥
15kgタイプ
夜露でも溶ける肥料
寒い時でも効果を発揮
家庭菜園向け1kgボトル入りも。

サンアグロ

④3 有機サツマイモ専用S300

20kg入



N	P	K
3	10	10

10a当り 5袋

商品特長

有機約50%入り粒状タイプのサツマイモ専用肥料。

朝日アグリ

④4 スーパーエコロング413 140日

10kg入



N	P	K
14	11	13

10a当り 2〜4袋 (20〜40kg)

商品特長

肥効調節型肥料。初期(約40日間)は溶出せず後半100日間で全体8割の肥料成分が溶出。他70,100,180,220日タイプも。

ジェイカムアグリ

④5 エコレット一発484

20kg入



N	P	K
14	8	14

商品特長

豚ふん堆肥+ロング肥料が組合わさったエコレット。
肥効の期間:4ヶ月〜5ヶ月
ネギ・果菜類向け

朝日アグリ

④6 有機入SC玉ねぎ専用16号

20kg入



N	P	K
16	11	10

10a当り 6袋

商品特長

硫黄を好む玉ねぎ専用肥料
硫黄被覆尿素入り
動物由来の有機を多く含む

サンアグロ

園芸肥料【野菜向け】

④7 豆プロ一発

20kg入



N	P	K
25	10	8

10a当り 1~1.5袋 (20~30kg)

商品特長

大豆、枝豆向け一発肥料。
窒素成分の約7割が緩効性肥料

ジェイカムアグリ

④8 エコレット808

20kg入



N	P	K
8	10	8

商品特長

豚ふん堆肥を約50%使用することで
低コスト化を実現。粒状のため、
まきやすく機械散布も可能。
あらゆる作物に使用出来ます。

朝日アグリ

④9 エコマスター025

20kg入



N	P	K
10	12	5

10a当り 5~10袋 (100~200kg)

商品特長

- ・豚ふん堆肥を約30%配合し、リン酸原料の一部に「亜リン酸」を使用した有機入りペレット肥料。
- ・「亜リン酸」は通常のリン酸と比べ作物に吸収されやすく、初期生育の促進や根張り向上に期待できます。

片倉コープアグリ

⑤0 NKグリーン30号

20kg入



N	P	K
16	0	14

10a当り 1~2袋

商品特長

長年使い続けられている
野菜専用追肥
玉ねぎ・そら豆等幅広く使用

サンアグリ

園芸追肥

⑤1 野菜追肥専用S842

20kg入



N	P	K
18	4	12

10a当り 1~2袋

商品特長

追肥専用肥料。
植物が好んで吸収する硝酸態窒素
が約5割含まれる。

ジェイカムアグリ

⑤2 ニッピ良菜培土SP200

15kg入



N	P	K	苦土
200	2500	200	200 (mg/l)

商品特長

腐植質を入れ、軽く保水性の良い
葉菜向け培土
約25ℓ

日本肥糧

その他園芸培土

⑤3 げんきくん果菜200

20kg入



N	P	K
200	3000	150 (mg/l)

商品特長

粉・粒状の土に肥料成分、木質炭、
ピートモスを混合した透水性・
保水性に優れた培土
約26ℓ

片倉コープアグリ

土づくり資材【石灰・窒素・苦土肥料】

⑤4 苦土石灰(粉)

20kg入



アルカリ	苦土
55	11

10a当り120~160kg

商品特長

粉状品
苦土入り石灰資材
畑作の養分に必要な石灰と苦土
を補給します。

吉澤石灰

土づくり資材【石灰・窒素・苦土肥料】

⑤⑤ 粒状 苦土石灰

20kg入



アルカリ 苦土

55 10

10a当り120～160kg

商品特長

粒状品
苦土入り石灰資材
畑作の養分に必要な石灰と苦土を補給します。

吉澤石灰

⑤⑥ 消石灰P-70

20kg入



アルカリ

70

10a当り60～200kg

商品特長

粉状品。酸性土壌の矯正、石灰の補給をします。
酸性の強い土壌:120～200kg
酸性の弱い土壌: 60～100kg

吉澤石灰

⑤⑦ 顆粒消石灰ホープ

20kg入



アルカリ

72

10a当り60～200kg

商品特長

顆粒品。酸性土壌の矯正、石灰の補給をします。
酸性の強い土壌:120～200kg
酸性の弱い土壌: 60～100kg

吉澤石灰

⑤⑧ 畑のカルシウム

20kg入



カルシウム

28.5

商品特長

水溶性カルシウムを約26%含んだ
作物のカルシウム欠乏対策や根張り改善に適した肥料

片倉コープアグリ

土づくり資材【窒素・苦土肥料・リン酸・ケイ酸】

⑤⑨ 石灰窒素(粒)

20kg入



N

20

商品特長

土に成分が吸着されるため環境への影響が少なく長効きの窒素肥料
水田刈り取り後の稲ワラ腐熟促進、
ジャンボタニシへの農薬登録あり

片倉コープアグリ

⑥⑩ 硫マグ(粒)

20kg入



苦土

25

商品特長

葉緑素の基、速効性苦土資材
元肥・追肥問わず施肥可能。

ナイカイ商事

⑥① 過石(粒) 17.5%

20kg入



P

17.5

商品特長

水溶性の速効性リン酸資材

片倉コープアグリ

⑥② 苦土過石(粒)

20kg入



P

17

苦土

3.5

商品特長

＜溶性苦土入り＞
リン酸資材

片倉コープアグリ

土づくり資材【窒素・苦土肥料・リン酸・ケイ酸】

⑥3 粒状ようりん

20kg入



P	苦土
20	12

商品特長

粒状品。
ゆっくり溶け出すリン酸資材。

朝日アグリア

⑥4 粒状BMようりん

20kg入



P	苦土	マンガン	ホウ素
20	12	1	0.5

商品特長

粒状品。
ゆっくり溶け出すリン酸資材
ホウ素・マンガン等微量元素入り。

朝日アグリア

⑥5 苦土重焼燐

20kg入



P	苦土
35	4.5

商品特長

早効き・遅効きの2種類のリン酸を含み、生育初期から後期まで肥効が持続する高性能リン酸資材

小野田化学工業

⑥6 農力アップ

20kg入



ケイ酸	アルカリ	苦土	マンガン
20	43	2	1.2

10a当り 3袋(60kg)

商品特長

粒状ケイカルの代替品。
ケイ酸の吸収利用率が高く、倒伏しにくい健康な稲づくりに効果的。含有する鉄・マンガンが根を守ります。

乳白軽減対策にオススメ肥料

産業振興

土づくり資材【リン酸・加里・ケイ酸・微量元素材】

⑥7 けい酸加里

20kg入



加里	ケイ酸	苦土	ホウ素
20	34	4	0.1

商品特長

(水稻・園芸向け肥料)
ゆっくり効くカリとケイ酸が、高温障害対策、倒伏軽減に役立ちます。元肥施肥も可能。

乳白軽減対策にオススメ肥料

開発肥料

⑥8 マルチサポート2号

20kg入



苦土	ケイ酸	マンガン	ホウ素
12	20	0.2	0.2

商品特長

苦土、ケイ酸、微量元素がバランスよく配合されており、倒伏軽減、登熟向上が期待できます。元肥・中間追肥どちらも施用可。

小野田化学工業

⑥9 稲サポ

15kg入



P	K	苦土	マンガン	ケイ酸
7	6	3	3	8

商品特長

水稻に必要なリン酸・加里・苦土・マンガン・ケイ酸と約30%の牛糞が入った土壌改良資材。形状はペレット。

朝日アグリア

⑦0 レオグリーン特号

20kg入



ペレット型堆肥

10a当り 約10袋

商品特長

省力的堆肥
腐植酸の効果で根張り、肥料のもちの向上が期待できる

朝日アグリア

土づくり資材【リン酸・加里・ケイ酸・微量要素材】

⑦1 ネバリン

20kg入



使用量 畑:4~5袋/10a
水田:2~3袋/10a

商品特長

水溶化腐植入り土壌改良資材
腐植酸の溶出がゆっくり長期間継続
します。健全な根張りとう生育、品質・
収量アップ

日本肥種

⑦2 まかい4

20kg入



土壌改良資材
P 苦土 マンガン ホウ素 アルカリ
5 10 0.2 0.1 45
10a当り 5~10袋

商品特長

ようりん・苦土石灰・微量要素・
腐植酸の4種類が1粒になった、
まきやすい改良材。

朝日アグリ

⑦3 ハイフミンハイブリッドG

15kg入



土壌改良資材

商品特長

良質な腐植物質を豊富に含んでいる
ので、根の活性・根張りを良くします。
有用微生物のトリコデルマ菌の働き
により微生物環境改善・作物活性促進

日本肥種

稲わらの腐熟促進・
温室効果ガス削減のため、
秋にすき込み(秋耕)を
実施しましょう。



土づくり資材【堆肥・有機質資材】

⑦4 小櫃発酵ケイフン(細粒)

15kg入



N	P	K
2.5	5.4	4.7

※成分分析例

商品特長

中温発酵によってできた有機肥料
ですから、有効微生物を増殖し
土壌を肥沃にします。

JAきみつ

⑦5 みのに堆肥

20kg入



樹皮堆肥

商品特長

樹皮を高温発酵、熟成した堆肥。

富士見工業

獣害対策お済みですか? 御見積もお気軽に!!

野生動物による被害対策なら電気柵!!

安全安心 日本製 保証期間 1年間 1万ボルト!

必要な資材が全て入った **100mセット**

注文 No.3000

Z-1500-ONE (有効電線距離1500m) ハイパワー菜園 2段・100mセット

価格目安 1500m対応可能、単一電圧設定で使えない畑に比べ稼働日数が倍増約80日に
パワーアップした2段電圧設定で必要資材が全て入ったお任せセット。

お問い合わせ先
南部営農購買センター TEL 0475-42-4343
北部営農購買センター TEL 0475-33-7007
西部営農購買センター TEL 0475-35-3001

※一部電圧設定で稼働日数は変動します
※本格的な稼働約30日稼働

お問い合わせは各センターへ。

土の健康診断してみませんか？

水田もOKです！

作物を正常に育成させるためには、土壌中の養分状態を作物の要求する量に調節するとともに、他の成分とのバランスをとらなければなりません。そのためには、土壌の不足する養分と過剰な養分を把握する【土壌診断】が必要です。

水田の秋落ち対策※1として、土壌の養分状態を知り、不足している養分を補うことで収穫対策が出来ます！

JA長生では、土壌診断結果(処方箋)に基づいた適正な施肥設計を提案し、作物の収量安定、施肥コスト低減に取り組んでいます。

※1【秋落ちとは、稲作において登熟期以降に急激に生育が衰え、収量が低下する現象のこと】

リン酸、カリなどの養分が蓄積した圃場では、せっかくの施肥もムダになるし、作物の健康にも影響するんだ。



診断結果をもとに健康な土に生まれ変われば、施肥量を減らしても収量・品質はそのままか、それ以上に！

土壌養分の過不足がわかり、作物の収量・品質が安定・向上します。

基準より多い養分は減らして、少ない養分は増やすことで最適な土壌バランスに近づけることができ、作物の収量、品質が安定・向上します！

土づくり資材等の適切な投入量がわかり、施肥コストが減らせます！

土壌診断で資材の投入量がわかれば、無駄が省けて、その分だけ施肥コストを減らせます。



土壌サンプルの採り方

- 1 土を採る場所と時期**
土のサンプルは中央と対角線の5カ所から採り、合わせて均一にしてください。
収穫後、次作の作業（耕起・施肥）に入る前に採取しましょう。
- 2 土の採り方**
表土1cmぐらいを除いてから、深さ10～20cmの作土を移植ゴテで採ります。
- 3 採取した土を乾かす**
採取した土は、新聞紙などの上に薄く広げ、風通しの良いところで1週間くらい乾燥させます。
- 4 乾かした土を篩をかける**
乾燥させた土を2mmの目開きの篩に通して、細かい土を集めます。篩に残った土は、軽く砕いて、また篩に通します。
- 5 サンプルを土壌採取袋に入れる**
所定の土壌採取袋（封筒）に土のサンプルを入れ、必要事項を書き込んで、JAの担当職員へお渡しください。

土壌診断結果は、1か月以上かかりますので、お早めに申し込み下さい。（申込状況により前後します）

詳しくは、JA長生ホームページをご確認ください。

土壌診断料金等は、下記 担い手支援課、営農購買センターへお問い合わせください。

JA長生 営農販売部 担い手支援課
TEL 0475-24-5700

南部営農購買センター
TEL 0475-42-4343

北部営農購買センター
TEL 0475-33-7007

西部営農購買センター
TEL 0475-35-3001

バイオスティミュラント(BS)の紹介

環境ストレスを打破し、収量・品質・棚持ち性を最大化する注目の新資材

バイオスティミュラントとは

植物に対する非生物的ストレスを抑制することにより気候や土壌のコンディションに起因する植物のダメージを軽減し、健全な植物を提供する新しい技術です。

スキープオン(Skeepon)



やまびこジャパン

**酢酸の新たな効果を利用した、
高温・乾燥対策資材！**

- ① 高温・乾燥耐性を同時に強化
高濃度酢酸成分による遺伝子活性・耐性強化
- ② 作業の省力化に寄与
欠株、補植、灌水の負担を減らし作業負担を軽減
- ③ 持続効果抜群
1度の施用で最大3ヵ月の持続効果

標準希釈

500倍(トマト、ネギ、水稻などは250倍推奨)

主な用途

花卉、野菜、果樹、水稻全般

リーフエナジー(LEAFENERGY)



やまびこジャパン

**ストレスによるバテを改善し、
健全な生育をサポート！**

- ① 素早い浸透吸収
希少脂肪酸を速効チャージでバテを改善
- ② なり疲れ改善
継続散布で長期どりでも後半まで旺盛に生育
- ③ 遺伝子活性効果
基礎代謝向上でストレスに負けない生育をサポート

標準希釈

<育苗>10~100倍(葉面散布)
<定植後>1000倍または10a当たり250ml
(葉面散布)

主な用途

花卉、野菜、果樹、水稻全般

ギャクシー(GAXY)



平林物産

**圧倒的高コスパ!着花・果実肥大と
環境ストレス対策を両立**

- ① 着花・果実肥大促進
ポリアミン生産を増幅し成長を強力サポート
- ② 吸収改善
難吸収性のホウ素・カルシウム等の吸収効率を向上
- ③ 作業性抜群
低粘度仕様。肥料・農薬との混用&ドローン散布可能
- ④ 高希釈
5000~10000倍希釈で1haあたりのコストを大幅削減

標準希釈

5,000~10,000倍(葉面散布)

主な用途

花卉、野菜、果樹、水稻全般

ロダルゴ(RODARGO)



平林物産

**高温・乾燥から作物を守る!
物理コート+光合成サポート**

- ① 物理コート効果
カラギナン多糖類が表層をカバーし萎れをブロック
- ② 棚持ち性向上
収穫後の果実の軟化を防ぎ、硬度・糖度・テリを保持
- ③ 光合成 & 根域活性
クロロフィル量を増加させ、根と葉の活力を維持
- ④ 速効性
生育中~後期の散布で、出荷時の青果品質を大幅アップ

標準希釈

2,000~5,000倍(葉面散布)

主な用途

トマト、スイカ、バンジー、果菜類等

炎天マスター



OATアグリオ

**植物の耐暑性強化!!
高温ストレス軽減による収量&
品質向上!!**

- ① 高温耐性向上
有効成分が耐暑機能(HSF遺伝子)を強化し、高温下での生育をサポート。
- ② 活性酸素除去
植物体内の活性酸素を除去することで、高温によるダメージを軽減。
- ③ 農業混用可&育苗期使用可

標準希釈

500~1000倍(ドローン散布は8倍)
葉面散布(1~2週間おき)

主な用途

野菜、果菜、果樹、水稻全般

楽農美人



**マルチな効能で作物の成長を
サポート**

- ① 土壌改善
微生物の多様性を高め、発病しにくい土壌へ
- ② 発根の改善
有用微生物の働きで根張りを改善
- ③ 植物の健康維持に貢献
植物本来の生命力を引出す働きをサポート
- ④ 高温対策
植物内のタンパク質生成に関わる光合成能力を維持

標準希釈

500~4000倍
(灌水、灌注、葉面散布、ドブ漬け)

主な用途

果菜、果樹、葉菜、菊

京葉ガスエナジーソリューション

水稻育苗消毒剤【育苗箱・培土・育苗】

① イチバン

500ml



水150リットル当り
150ml～300ml
使用時期:育苗箱の消毒

商品特長

瞬時浸漬または散布(ジョウロ散布)にて育苗箱を消毒。水洗、乾燥の必要がない。

OATアグリオ

② テクリードCフロアブル

100ml・500ml



希釈倍数:200倍
使用時期:浸種前
使用方法:24時間浸漬

商品特長

ばか苗病を強力に抑える種子消毒剤。種子に浸透する力が強いので、陰干しの作業を省いてもOK。

クマイ化学

③ ヘルシードTフロアブル

100ml・500ml



希釈倍数:200倍
使用時期:浸種前
使用方法:24時間浸漬

商品特長

種子伝染性のばか苗病や苗立枯病の種子消毒剤。糸状菌病害から細菌性病害まで効果を示す。

北興化学

④ フタバロンA粉剤

500g



覆土1L当り5g
使用時期:覆土前
使用方法:覆土に均一に混和

商品特長

カスミンとダコニールの混合剤。苗立枯病(リゾプス菌)、もみ枯細菌、苗立枯細菌病に有効。

北興化学

⑤ カスミン液剤

500ml・20L



希釈倍数:4～8倍(5倍がおすすめ)
使用時期:覆土前
使用液量:育苗箱1箱当り希釈液50ml

商品特長

箱育苗で発生する各種細菌病(もみ枯細菌病)に対して高い効果を示す。いもち病にも効果。

北興化学

⑥ ナエファインフロアブル

100ml



希釈倍数:1000～2000倍
使用液量:育苗箱1箱当り0.5～1ℓ
使用時期:は種時～緑化期

商品特長

3つの苗立枯病菌(ピシウム、リゾプス、フザリウム)に高い効果と育苗箱内の根張り向上。

クマイ化学

⑦ タチガレエースM粉剤

1kg



使用量:育苗箱1箱当り6～8g
使用時期:は種前

商品特長

苗立枯病などの防除と優れた健苗育成効果。ムレ苗防止に安定した効果。

三井化学クロップ&ライフソリューション

⑧ ダコレート水和剤

100g



希釈倍数:400～600倍
使用液量:育苗箱1箱当り0.5ℓ
使用時期:は種時～緑化期
但し、は種14日後まで

商品特長

ダコニールとベンレートを混合した苗立枯病剤。予防と治療の両面のはたらきで的確な防除効果。

クマイ化学

水稻育苗消毒剤【育苗箱・培土・育苗】

⑨ ダコニールアルファ

100g・250g



希釈倍数:2000倍、4000倍
使用液量:育苗箱1箱当たり500ml(2000倍時)
育苗箱1箱当たり1L(4000倍時)
使用時期:播種時～緑化期、但し移植15日前まで

商品特長

ダコニール1000フロアブル後継品目。
フロアブルから顆粒水和剤へ変更。
また希釈倍数も1000倍から2000倍へ変更。
水稻育苗時の苗立枯病(リゾープス菌)に高い効果。

クミアイ化学

⑩ フジワン粒剤

3kg



25～50g/育苗箱1箱 箱施用:苗の緑化始期
いもち病、ムレ苗防止、根の伸長および発根促進
3～5kg/10a 本田散布:葉いもち/初発7～10日前
穂いもち、白未熟粒の発生軽減/出穂10～20日前

商品特長

水稻の育苗箱処理により根の伸長および発根を促進し健苗育成ができるとともに、ムレ苗防止効果がある。
本田処理においては高温登熟下における白未熟粒の発生軽減効果があり、高品質米の生産に貢献。

日本農薬

水稻育苗箱施用剤

いもち十紋枯れ十殺虫

⑪ エバーゴルフフォルテ箱粒剤

1kg・10kg



50g/育苗箱1箱
※高密度に、は種する場合は1kg/10a
(育苗箱1箱当たり50～100g)は種時処理は×
使用時期:は種時(覆土前)～移植当日

商品特長

いもち病、紋枯病、初期害虫が
同時防除できる箱処理剤。
長い残効性が特長。

クミアイ化学

いもち十殺虫

⑫ ブーンパディート箱粒剤

1kg・3kg



50g/育苗箱1箱
※高密度に、は種する場合は1kg/10a
(育苗箱1箱当たり50～100g)
使用時期:は種時(覆土前)～移植当日

商品特長

処理後早めにいもち病の高い
抵抗力を示し長期間抑える。
ごま葉枯病や幅広い害虫にも有効。

クミアイ化学

いもち十殺虫

⑬ ルーチンコア箱粒剤

1kg・10kg



50g/育苗箱1箱
※高密度に、は種する場合は1kg/10a
(育苗箱1箱当たり50～100g)
使用時期:移植3日前～移植当日

商品特長

いもち病、初期害虫に高い防除効果
を示す「低コスト」箱処理剤。

北興化学・バイエルクロップサイエンス

殺虫

⑭ プリンス粒剤

1kg・10kg



50g/育苗箱1箱
※高密度に、は種する場合は1kg/10a
(育苗箱1箱当たり50～100g)
使用時期:は種前～移植当日

商品特長

播種時から使用できる。
播種前の床土混和处理も可能。
初期害虫～チョウ目害虫に対し
優れた効果。

北興化学

殺虫

⑮ アドマイヤーCR箱粒剤

1kg・3kg



50g/育苗箱1箱
※高密度に、は種する場合は1kg/10a
(育苗箱1箱当たり50～100g)
使用時期:は種時(覆土前)～移植当日

商品特長

イネミズゾウムシ、イネドロオウムシ、
ウンカ類に対し高い防除効果を発揮。

クミアイ化学

⑯ ワンリード箱粒剤08

3kg



50g/育苗箱1箱
※高密度に、は種する場合は1kg/10a
(育苗箱1箱当たり50～100g)
使用時期:は種時(覆土前)～移植当日

商品特長

イネミズゾウムシ、イネドロオウムシ
に対して長期間にわたって優れた
効果を発揮。

クミアイ化学

水稻育苗箱施用剤

殺虫

⑰ オンコル粒剤5

3kg



50g/育苗箱1箱
使用時期:移植3日前～移植当日

商品特長

イネミズゾウムシ、イネドロオイムシの防除。3kg1袋で育苗箱60枚に使用可能。

OATアグリオ

⑱ パダン粒剤4

3kg



50g～100g/育苗箱1箱
使用時期:は種前又は移植当日

商品特長

イネドロオイムシ、イネミズゾウムシなどの初期害虫防除の他、ジャンボタニシ(食害防止)に効果あり。

協友アグリ

水稻除草剤【初期剤】

⑲ サキドリEW

500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:植代後～移植前7日、または移植直後～ノビエ1葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

発生前のノビエ・コナギ・ホタルイ・アゼナに高い効果。雑草イネ対策剤としても有効。

クマイ化学

⑳ エリジャン乳剤

300ml



10a当り:300ml
使用時期:植代後～移植7日前又は移植直後～ノビエ1葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

初中期一発剤・中期剤との体系処理推奨。ノビエ・ホタルイ・アゼナなどに高い効果。

シンジェンタジャパン

㉑ 先陣ジャンボ

200g



10a当り:200g (20g×10パック)
使用時期:植代後～移植7日前又は移植直後～ノビエ1葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

藻類に抑制効果の高い2成分配合。藻類の発生前散布でアオミドロ・表層はく離に高い効果を示す。オモダカ、コウキヤガラ等の多年生雑草にも有効。

協友アグリ

水稻除草剤【初中期一発 フロアブル】

㉒ ラオウフロアブル

田植同時可 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

トップガン剤の後継剤。内容をパワーアップさせただけでなく従来よりも低価格を実現。

クマイ化学

㉓ サラブレッドGOフロアブル

田植同時可 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

サラブシリーズ第4弾 サラブレッドKAIより、ノビエを長期間抑制し、ホタルイに高い効果を発揮。4成分一発剤(低コスト)

協友アグリ

㉔ バッチリLXフロアブル

田植同時可 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、クサネム、コナギなど優れた効果。

協友アグリ

水稻除草剤【初中期一発フロアブル】

②⑤ 銀河αフロアブル

500ml



10a当り:500ml
使用時期:移植後3日～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

新規有効成分「ベルダー」配合。
ホタルイ、クログワイ、コウキヤガラなど
カヤツリグサ科の難防除雑草にお困り
の方に特におすすめ。

日産化学

②⑥ カウントダウンフロアブル

田植同時可 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエ3.5葉、ホタルイ、オモダカ、
コウキヤガラ、クログワイ卓効。
雑草イネ対策に有効。

クミアイ化学・バイエルクロップサイエンス

②⑦ プライオリティフロアブル

田植同時可 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ホタルイは卓効。オモダカ、
コウキヤガラ等の塊茎形成や
キシウスズメノヒエ、イボクサ
等を抑制。

クミアイ化学

②⑧ エンペラーフロアブル

田植同時可 500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

早めに効く成分と遅く効く成分の
組合せで、長期間のノビエ対策が
実現。発生前の藻類も抑える。

クミアイ化学

②⑨ カイリキZフロアブル

500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植後3日～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

カチボシフロアブルのパワーアップ版。
クログワイ、オモダカ等の塊茎抑制
効果有。

北興化学

③⑩ ボデーガードプロフロアブル

500ml・2L



10a当り:500ml
使用時期:移植後5日～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに高い殺草力と長期残効有。
コウキヤガラ、オモダカ等の塊茎形成
抑制、畦畔侵入性雑草に効果。

北興化学・バイエルクロップサイエンス

③⑪ ディオーレフロアブル

500ml



10a当り:500ml
使用時期:移植後1日～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

コメット、シグナスのパワーアップ後継剤。
ホタルイ、オモダカ、クログワイ、コウキ
ヤガラに強い成分「アルテア」を増量。
根まで効くため、翌年の発生も減らす。
ノビエの残効も強化。

日産化学

③⑫ クサウェポンフロアブル

田植同時可 500ml、5L



10a当り:500ml
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに対する長期残効有。
イボクサ、キシウスズメノヒエ等の
侵入系雑草も抑制。

三井化学クロップ&ライフソリューション

水稲除草剤【初中期一発粒剤】

③③ ラオウ 1キロ粒剤 田植同時可 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

トップガン剤の配合成分を
パワーアップさせた後継剤。
しかも、従来よりも低価格を実現。

クミアイ化学

③④ サラブレッドGO1キロ粒剤 田植同時可 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

サラブシリーズ第4弾
サラブレッドKAIより、ノビエを
長期間抑制し、ホタルイに
高い効果を発揮。
4成分一発剤(低コスト)

協友アグリ

③⑤ バッチリLX 1キロ粒剤 田植同時可 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、
クサネム、コナギなど優れた効果。

協友アグリ

③⑥ カチボシ 1キロ粒剤51 田植同時可 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに70日間の長期残効。
ホタルイ、クログワイ等の多年生
雑草、イボクサ、クサネム等に卓効。

北興化学

③⑦ センイチMX 1キロ粒剤 田植同時可 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、収穫60日前まで

商品特長

長い散布期間と殺草効果、効果発現
の速さが特長。イボクサ・藻類も抑制。

石原バイサイエンス

③⑧ プライオリティ 1キロ粒剤 田植同時可 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ホタルイは卓効。オモダカ、
コウキヤガラ等の塊茎形成や
キシュウスズメノヒエ、イボクサ等
を抑制。

クミアイ化学

③⑨ ゼアス 1キロ粒剤 田植同時可 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

新成分「ベルダー」配合でホタルイやコウキヤガ
ラ、クログワイなどの多年生カヤツリグサ科雑
草に卓効。非SU剤でありながら、バランスの取
れた3成分剤でヒエへの残効、広葉雑草もしっ
かりカバー。稲への安全性も高く、田植同時や
新規需要米での使用にもピッタリ。

日産化学

④⑩ ディオーレ 1キロ粒剤 田植同時可 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

コメット、シグナスのパワーアップ後継剤。
ホタルイ、オモダカ、クログワイ、コウキ
ヤガラに強い成分「アルテア」を増量。
根まで効くため、翌年の発生も減らす。
ノビエの残効も強化。

日産化学

水稲除草剤【初中期一発粒剤】

④1 エンペラー 1キロ粒剤 田植同時可 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期
但し、収穫60日前まで

商品特長

早めに効く成分と遅く効く成分の
組合せで、長期間のノビエ対策が
実現。発生前の藻類も抑える。

クミアイ化学

④2 ボデーガードプロ 1キロ粒剤 田植同時可 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに高い殺草力と長期残効有。
コウキヤガラ、オモダカ等の塊茎
形成抑制、畦畔侵入性雑草に効果。

北興化学・バイエルクロップサイエンス

④3 スパークスター粒剤 3kg



10a当り:3kg
使用時期:移植後5日～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

藻・表層剥離の予防効果あり。
クログワイ防除は初期剤との
体系で高い効果。

日産化学

④4 クサウェポン 1キロ粒剤 田植同時可 1kg・16kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに対する長期残効有。
イボクサ、キシウスズメノヒエ等の
侵入系雑草も抑制。

三井化学クロップ&ライフソリューション

④5 銀河α 1キロ粒剤 田植同時可 1kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

新規有効成分「ベルダー」配合。
ホタルイ、クログワイ、コウキヤ
ガラなどカヤツリグサ科の難防
除雑草にお困りの方に特に
おすすめ。

日産化学

④6 セイテン 1キロ粒剤 田植同時可 1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植時～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

藻類、表層剥離に対し抑制効果を
示すジメタメトリン配合。
ノビエに対し長期残効性があります。

クミアイ化学

巻末に
【水稲低コスト大型規格農薬】の
予約注文書が掲載されています。
お見逃しなく!!



水稻除草剤【初中期一発 ジャンボ剤】

④7 ラオウジャンボ

250g・750g



10a当り:250g (25g×10/パック)
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

トップガン剤の配合成分をパワーアップさせた後継剤。しかも、従来よりも低価格を実現。

クミアイ化学

④8 バッチリLXジャンボ

400g・4kg



10a当り:400g (40g×10/パック)
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ホタルイ、コウキヤガラ、オモダカ、クサネム、コナギなど優れた効果。

協友アグリ

④9 センイチMXジャンボ

500g



10a当り:500g (50g×10/パック)
使用時期:移植後1日～ノビエ3.5葉期
但し、収穫60日前まで

商品特長

長い散布期間と殺草効果、効果発現の速さが特長。イボクサ・藻類も抑制。

石原バイオサイエンス

⑤0 ボデーガードプロジャンボ

300g・900g



10a当り:300g (30g×10/パック)
使用時期:移植後5日～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ノビエに高い殺草力と長期残効有。コウキヤガラ、オモダカ等の塊茎形成抑制、畦畔侵入性雑草に効果。

北興化学・バイエルクロップサイエンス

⑤1 プライオリティジャンボ

250g・750g



10a当り:250g (25g×10/パック)
使用時期:移植直後～ノビエ3.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

ホタルイは卓効。オモダカ、コウキヤガラ等の塊茎形成やキシウスズメノヒエ、イボクサ等を抑制。

クミアイ化学

⑤2 サラブレッドGOジャンボ

400g・4kg



10a当り:400g (40g×10/パック)
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

サラブシリーズ第4弾 サラブレッドKAIより、ノビエを長期間抑制し、ホタルイに高い効果を発揮。4成分一発剤(低コスト)

協友アグリ

⑤3 セイテンジャンボ

250g・750g



10a当り:250g (25g×10/パック)
使用時期:移植直後～ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

藻類、表層剥離に対し抑制効果を示すジメタメトリン配合。ノビエに対し長期残効性があります。

クミアイ化学

⑤4 銀河αジャンボ

400g



10a当り:400g (40g×10/パック)
使用時期:移植後3日～ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで

商品特長

新規有効成分「ベルダー」配合。ホタルイ、クログワイ、コウキヤガラなどカヤツリグサ科の難防除雑草にお困りの方に特におすすめ。

日産化学

水稲除草剤【中後期剤・藻の発生時】

⑤⑤ モゲトン粒剤

3kg



10a当り:2~3kg
使用時期:ウキクサ類、藻類の発生
始~発生盛期
但し、収穫45日前まで

商品特長

ウキクサ類、藻類、表層剥離の
予防・治療剤(晴天時使用)
使用回数は3回まで

アグロカネショウ

⑤⑥ アトリ豆つぶ250

250g



10a当り:250g(湛水散布)
使用時期:移植後14日(稲5葉期以降)
~ノビエ4葉期
但し、収穫45日前まで

特長

オモダカ矢尻葉3葉期、クログワイ、
コウキヤガラは草丈30cm、ノビエは
4葉期まで有効。

クミアイ化学

⑤⑦ ツイゲキ豆つぶ250

250g



10a当り:250g(湛水散布)
使用時期:移植後14日(稲5葉期以降)
~ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで

商品特長

アトリ1袋分と15cm程度のホタルイ
を強力に抑える成分を組合せた
ハイスベックな新中後期剤。

クミアイ化学

⑤⑧ レブラスギア1キロ粒剤

1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植後14日~ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで

商品特長

レブラスのパワーアップ後継剤。
配合した除草成分同士の相性の良さで、
より大きな雑草を枯らす。
コウキヤガラ、クログワイは50cmまで、
ホタルイは20cmまで、オモダカは
矢尻葉4葉期まで効果を発揮する。

日産化学

⑤⑨ ツイゲキ 1キロ粒剤

1kg・10kg



10a当り:1kg
使用時期:移植後14日(稲5葉期以降)~
ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで

商品特長

アトリ剤に更に2成分追加し効果強化。
ホタルイ15cmまで(散布適期)、クログワイ、
コウキヤガラ草丈30cm、オモダカ矢尻葉4葉期
ノビエ4葉期まで有効。

クミアイ化学

⑥⑩ クリンチャーバスME液剤

500ml



10a当り:1000ml(水100Lに本剤2本)
使用時期:移植後15日~ノビエ5葉期
まで(収穫50日前まで)

商品特長

取りこぼしたノビエ及び広葉雑草に
有効。落水及び浅水状態で散布。
※展着剤加用不可

北興化学

⑥① ウィードコア 1キロ粒剤

1kg



10a当り:1kg
使用時期:移植後7日~ノビエ4葉期
但し、収穫60日前まで

商品特長

30cmのオモダカ・クサネム、40cmの
イボクサを速効的に叩く。可能な
範囲で深水を推奨。

北興化学

⑥② ロイヤント乳剤

200ml



希釈倍数:500倍
使用時期:移植後20日~ノビエ5葉期
但し、収穫45日前まで

商品特長

大きくなった60cmまでのイボクサや、
キシウズメノヒエを速効的に叩く。
局所散布。最後の切り札。

クミアイ化学

水稲用殺虫剤【ジャンボタニシ食害防止・カメムシ防除】

⑥3 スクミノン

2kg・10kg



10a当り:1~4kg
使用時期:収穫60日前まで(2回以内)

商品特長

ジャンボタニシが摂食後30分で麻痺を引き起こし、24時間後にはほぼ死滅する。

クミアイ化学

⑥4 ジャンボたにしくん

2kg



10a当り:1~2kg
使用時期:収穫60日前まで(2回以内)

商品特長

ジャンボタニシへの優れた殺虫効果。粒径2~3mmで細かくてまきやすく、安定した効果を発揮。

住友化学

⑥5 スタークル粒剤

3kg



10a当り:3kg
使用時期:収穫7日前まで

商品特長

各種カメムシ類に高い効果。速やかに稲体内に吸収され、斑点米を抑制。出穂期での散布を推奨。

北興化学

⑥6 スタークル豆つぶ

250g



10a当り:250g
使用時期:収穫7日前まで

商品特長

畦畔からの投げ込みで簡単にカメムシ防除。出穂期~穂揃期が適期。浅めの湛水散布がポイント。

クミアイ化学

⑥7 キラップ粒剤

3kg



10a当り:3kg
使用時期:出穂10日前~出穂期(収穫14日前まで)

商品特長

カメムシ類に対して高い効果と長い残効性有り。出穂10日前~出穂期が適期。

北興化学・バイエルクロップサイエンス

⑥8 トレボン粉剤DL

3kg



10a当り:3~4kg
使用時期:収穫7日前まで

商品特長

カメムシを含む水稲の主要害虫に対して幅広い効果。効果で高い殺虫効果。

クミアイ化学

水稲用混合剤

⑥9 ブラシントレボン粉剤DL

3kg



10a当り:3~4kg
使用時期:収穫7日前まで

商品特長

いもち病に対する予防と治療効果を有し、ごま葉枯病にも効果。カメムシ類(4kg/10a)との同時防除可。

北興化学

⑦0 ブラシン粉剤DL

3kg



使用量:10a当り3~4kg
使用時期:収穫7日前まで

商品特長

いもち病に対して治療と予防効果を有し、ごま葉枯病や穂枯れ性病害にも有効。

北興化学

水稲用殺菌剤【いもち病・紋枯れ病・稲こうじ病】

⑦① フジワンモンカット粒剤

3kg



10a当り:3~4kg
使用時期:出穂30~10日前
但し、収穫30日前まで

商品特長

いもち・紋枯れ病に優れた防除効果と残効性が期待。
稲こうじ病にも有効(4kg/10a)

日本農薬

⑦② モンガリット粒剤

3kg



使用量:10a当り3~4kg
使用時期:収穫30日前まで

商品特長

紋枯れ病・稲こうじ病等に有効。
稲での使用時期は出穂2~3週間前

三井化学クロップ&ライフソリューション

茎葉処理除草剤

⑦③ タッチダウンIQ

500ml・6L



希釈倍数:25~100倍

商品特長

散布後3~7日で枯れ始め、
根までしっかり浸透し、
約60日間雑草を抑制する。

シンジェンタジャパン

⑦④ ラウンドアップマックスロード

500ml・5.5L



希釈倍数:25~100倍
使用時期:スギナ25倍5月散布
多年生雑草50倍
一年生雑草100倍

商品特長

葉に散布された薬剤は速やかに吸収され植物体内を移行し根まで枯らす。

日産化学

⑦⑤ バスタ液剤

500ml・2.2L



10a当り:薬剤500ml~1000ml
少水量散布 希釈水量30ℓ~40ℓ
作物名:水稲畦畔収穫7日前まで
一年生、多年生雑草草丈30cm以下

商品特長

オヒシバ、オオアレチノギクをはじめ、幅広い種類の雑草に高い効果。根を枯らさない。

BASFジャパン

⑦⑥ プリグロックスL

1L・5L



希釈倍数:50~100倍

商品特長

かかった所だけ枯れるので、畝間や斜面の防除に最適。ヒエ多発圃場の稲刈取後散布で翌年の発生密度減。

シンジェンタジャパン

茎葉処理除草剤・その他

⑦⑦ ザクサ液剤

500ml・5L



希釈倍数:100~200倍
使用時期:水田畦畔収穫7日前まで

商品特長

スギナ、ツクサに100倍で効果
水田畦畔ではダイロンゾルとの混用を推奨(右記参照→)

北興化学

⑦⑧ ダイロンゾル

500ml



希釈倍数:400倍
使用時期:雑草発生前~雑草生育初期

商品特長

水田畦畔にて雑草発生初期までの使用、雑草生育期にザクサ液剤(100倍)との混用で除草作業の回数減。

北興化学

JA長生農機センターからのお知らせ

修理依頼などのお問い合わせは、JA長生農機センターへご連絡ください。

お伺いして修理・営業を行います。地区担当者が不在の場合はセンター内の他の担当者が対応いたします。

現場で修理できない場合は、センターへ引き上げて修理し、修理完了後、修理依頼者のお宅へ納品いたします。

JA長生農機センター（高根支所敷地内）

長生郡長生村本郷2548

TEL 0475-36-7745 FAX 0475-36-7749

営業時間:8:30～17:00（定休日:日・祝、12月～2月の土曜日）

春・秋の農繁期は平日営業以外も下記のとおり営業いたします。

春の農繁期（4月中旬～5月上旬）土・日・祝:8:30～17:00

秋の農繁期（8月上旬～9月上旬）土・日・祝:8:30～17:00

統括：大岩センター長

営業修理担当

八角担当：携帯 070-4128-4249

斎藤担当：携帯 070-4128-4248



営業修理担当

岩崎調査役：携帯 080-2091-7147

君塚担当：携帯 080-1502-9863

営業修理担当

玉井主任：携帯 070-3971-4820

篠原主任：携帯 070-4128-4251

工場修理担当：大岩センター長

事務担当：市原

車検はJA長生 にお任せください!



JA車検なら3つの安心

- 指定工場による丁寧な整備
- 国家資格を持った整備士による車検整備
- JAの安心費用
車検整備基本料金(軽自動車) **15,400円~**
(自賠責、諸税、交換部品等は含みません)

JAならこんなメリットも

代車無料

車検中の代車(軽自動車)
無料貸出しできます(相談ください)

お客様宅等への引取、納車無料

JA長生管内のご自宅、おつとめ先等へ無料
でお伺いします。

土曜日オイル交換サービスデー

土曜日サービス価格で提供



JA長生自動車センター
TEL.0475-44-1236

営業時間 平日・土曜日8:30~17:00

是非、お問い合わせください!

もしもの時…
安心のJA葬祭へ

葬儀・葬祭のことなら…

JA長生セレモニーサービスセンター

まずはお電話ください **TEL.0475-32-2383**

病院や施設等へお迎えにお伺いいたします

**24時間
365日対応**

霊安室も
完備して
あります

ほかにも

ご葬儀全般の
事前相談を
お受けしております。

詳しくは
ホームページを
ご覧ください



JA長生ホール やすらぎ
長生郡長生村七井土1452



公営斎場、寺院葬・自宅葬も承ります。

JA長生セレモニーサービスセンターはどなたでもご利用いただけます。

強くて選ばれる ガレージ・倉庫

KAKUICHI



軒高
3m
7m

奥行き最大15m

約3m間隔で連棟可能 ※200㎡まで対応!

カクイチ ガレージ兼用倉庫
広スペースハウス

頑丈な鉄骨構造 短工期 低コスト



全国12万棟の施工実績!



現場下見・プラン作成、お気軽にお問合せください! 見積り無料

お客様の声、掲載中!→
ガレージ倉庫のカクイチ



お問合せは...

JA長生

南部営農購買センター ☎42-4343 (担当地区) 一宮・睦沢・長生
北部営農購買センター ☎33-7007 (担当地区) 白子・本納・東郷
西部営農購買センター ☎35-3001 (担当地区) 長柄・長南・茂原
農機センター ☎36-7745

実物がみられる!
倉庫のショールーム
カクイチ A-SITE 茂原
茂原市東部台3-28-6
☎0475-44-5710
●定休日/水曜日、第2・第4日曜日
●営業時間/10:00~17:30



※写真・イラストはイメージです。 ※掲載商品の仕様・色等は、予告なく変更または取扱いを中止する場合があります。
※ご連絡いただいた個人情報は、申込商品等の発送・代金決済・アフターサービスに関すること、その他当組合の提供する案内に活用します。

※10㎡以上の建築物の場合は建築確認申請が必要です。 ※10㎡以下の建物でも防火・準防火地域の増築、更地への新築の場合は確認申請が必要です。また設置場所、規制等により建築基準法上の制限を受けることがあります。

NO.055158

組合員・利用者の皆様へ



新築、前回の塗装工事から
7年以上経過している方は
是非ご覧ください



お家の**健康診断**のお知らせ

外壁・屋根塗装

新築・塗り替えから何年経ちましたか？

7年～



塗装に思わぬ**劣化**が進行していないかチェックしておきましょう。塗り替えは早めの計画がおすすめです。

10年～



塗り替えの実施時期です。塗装の**劣化が進んでいる**可能性があるため、健康状態の確認がおすすめです。

13年～



外壁に**ヒビ・剥がれ・雨漏り**など、様々な**劣化**が見られる場合は、早急にメンテナンスをする必要があります。

ドローン・高所点検カメラによる 外壁・屋根診断

専門スタッフがご案内いたします。

家屋、倉庫等の外壁・屋根等の
傷みは大丈夫ですか？



**無料
診断
受付中**

●お申込み・お問い合わせは



南部営農購買センター	☎42-4343	(担当地区：一宮・睦沢・長生)
北部営農購買センター	☎33-7007	(担当地区：白子・本納・東郷)
西部営農購買センター	☎35-3001	(担当地区：長柄・長南・茂原)

No. 055075

Aquiro 株式会社 アクロ技研

■千葉営業所 0476(80)6050 ■関東支社 042(650)0322
■茨城営業所 029(831)1231 ■群馬営業所 027(224)1761

※ご連絡頂いた個人情報は申込商品等の発送代金決済、アフターサービスに關すること、その他組合の提供すること案内に活用します。



大切な家をシロアリから守るには

JA取扱業者の アサンテにお任せください！

全国シェア
No.1*

東証プライム
上場

累計施工実績
60万軒以上

1970年
創業

即日対応可能
ご相談ください

＊住宅用シロアリ防除トップ 東洋経済「会社四季報」2026年3集より



害虫・害獣対策もお任せください！

建物内に侵入した害虫・害獣を駆除（追い出し）を行い再侵入を防ぐ対策です。



ハチ



アライグマ



ハクビシン



ネズミ

床下診断・お見積りまで無料！まずは無料床下診断をご利用ください！



株式会社 アサンテ

www.asante.co.jp/

通話料
無料

研修を受けた自社スタッフが対応します。お気軽にご相談ください。



0120-955-694

受付時間 午前 8:30 ～ 午後 7:30（土日祝日も受付）

WEB からもお申込みいただけます ▶



JA 長生 アグリマイティー資金

農家経営の運転資金にご利用ください！！

●**基準金利 3年以内 年1.50%**
基金協会 保証料 年0.60%

特典 1 JA バンク利子補給

最大年 0.30%軽減

※100万円以上のお借入れに限ります。

特典 2 JA 長生 金利軽減

最大年 0.20%軽減

特典 3 基金協会 保証料率引き下げ

令和9年3月末まで 0.10%引き下げ



JA 長生金利軽減 JA バンク利子補給後金利

最大軽減後 年1.50%
(基金協会 保証料0.50%含む)



※審査の結果ご希望に添いかねる場合もあります。

特典 2 JA 長生金利軽減 適用条件の一例

1. JA カード（クレジットカード）を契約中または新たに契約される方。（0.20%）
2. 世帯で公的年金を受給の方、受給見込みの方。（0.10%）
3. 認定農業者の方。（0.20%）

※その他にも軽減項目がございます。また、軽減項目は最大金利軽減内で複数お選びいただけます。詳しくはお近くの JA 店頭窓口までお問い合わせください。

（例）アグリマイティー資金100万円を借入れ、春肥料を1月払いで予約購入した場合
⇒借入利息15,000円の支払いが発生しますが、肥料を予約価格で購入できるので、
50,000円の優遇が受けられます。

農業の営みに欠かせない

建物更生共済

農機具もガッチリ保障！！

My家財プラス

農業を支えるJA共済では…

個人所有のトラクターなどを含む農機具で、JA共済建物更生共済の共済掛金表上、住宅物件として引受けされる納屋、倉庫、農作業場に収容中の農業用機械器具を家財家具として取り扱います。

※農業用機械器具を収容する建物の用途により家財家具としてお取り扱いができず、お引受できない場合があります。

新価・実損保障
万一の際にも
安心！

◎新価・実損保障とは、建物内に収容した農機具が下記のような被害を受けた時、経過年数に関係なく同等の新品購入相当額を保障！

※収容とは建物内に格納され静止している状態をいいます。

自然災害



台風で納屋が倒壊し、
納屋内に収容していた
トラクターが損壊した。

盗難



盗難被害にあい、
倉庫内に収容していた
農薬散布車が
盗まれた。

落雷



落雷により、
農作業場内に
収容していた
保冷庫が
故障した。

落雷被害の多くは、雷が近くに落ちて電線に強い電流が流れ、コンセントにつながれている電化製品等が故障するといったものです。

(JA共済連調べ)

お問い合わせは、お近くのJA窓口へ

この資料は、概要を説明したものです。ご検討にあたっては「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

JA共済
【26129990104】

協力機関一覧

(指導機関)

長生農業事務所

(肥料メーカー)

朝日アグリア株式会社

小野田化学工業株式会社

開発肥料株式会社

片倉コープアグリ株式会社

サンアグロ株式会社

産業振興株式会社

ジェイカムアグリ株式会社

新ケミカル商事株式会社

セントラル化成株式会社

ナйкаイ商事株式会社

日本肥糧株式会社

富士見工業株式会社

吉澤石灰工業株式会社

(農薬メーカー)

アグロカネショウ株式会社

石原バイオサイエンス株式会社

OATアグリオ株式会社

協友アグリ株式会社

クミアイ化学工業株式会社

シンジェンタジャパン株式会社

住友化学株式会社

日産化学株式会社

日本農薬株式会社

バイエルクロップサイエンス株式会社

BASFジャパン株式会社

北興化学工業株式会社

三井化学クロップ&ライフソリューション(株)

(資材メーカー)

株式会社カクイチ

平林物産株式会社

やまびこジャパン株式会社

京葉ガスエネルギーソリューション株式会社

(編集)

JA長生

JA全農ちば

(生活資材メーカー)

株式会社アクロ技研

株式会社アサンテ

各種ローン・共済についてのご相談は
JA長生の窓口までお気軽にどうぞ!!

市外局番 0475

本所(融資課) ☎24-5120 高根支所 ☎32-2216 長南支所 ☎46-1223
一宮支所 ☎42-3700 白子支所 ☎33-2141 本納支所 ☎34-2233
睦沢支所 ☎44-1231 日吉支所 ☎35-2005 茂原支所 ☎24-5118

<https://www.ja-chosei.or.jp/> JA長生



農産物直売所 ながいき市場

生産者大募集!!



ながいき市場では
皆様が丹精を込めた農産物を
一生懸命販売させていただきます。



毎月お得な特売日!

- 毎週土、日、月曜...JAお米10%オフ
- 毎週火曜...トマト10%オフ
- 毎週水曜...ポイント2倍
- 毎週木曜...お肉特売
- 毎週金曜...たまご大特価



ながいき市場 住所: 茂原市六ツ野3981-1 TEL: 44-6800

営業時間: 9/1~5/31 9:00~18:00 6/1~8/31 9:00~19:00



JA長生 ながいき市場
公式Instagram
@jachosei

フォローしてね!



長生農業協同組合

南部営農購買センター ☎42-4343 FAX42-4342

【担当地区／一宮・睦沢・長生】

北部営農購買センター ☎33-7007 FAX33-6017

【担当地区／白子・本納・東郷】

西部営農購買センター ☎35-3001 FAX35-2007

【担当地区／長柄・長南・茂原】

※営業時間は8:30~17:00までとなります。

※日曜日は午前のみ(8:30~12:00まで)となります。

※土曜日・祝日は休みです。